

Standaard Edelparkieten Deel 2:



Grote Alexanderparkiet
Afrikaanse halsbandparkiet
Mauritiusparkiet
Pruimenkopparkiet
Rozekopparkiet
Grijskopedelparkiet
Finch-edelparkiet
Malabarparkiet - duifparkiet
Layardparkiet
Derbyparkiet
Java-baardparkiet
Rozeborst-baardparkiet
Nicobarenparkiet
Malakkaparkiet – langstaartparkiet
Nicobaren-langstaartparkiet
Engganoparkiet

Het geslacht *Psittacula*, edelparkieten

Algemene opmerkingen met betrekking tot het geslacht *Psittacula*, edelparkieten

Formaat: tussen 29 en 64 cm.

Strak bevederd, lange spits toelopende staart met twee verlengde staartpennen.

Duidelijk geslachtsonderscheid (seksueel dimorfisme): soms snavelkleur, soms tekening.

Duidelijk verschil met het jeugdkleed: na 1,5 – 2,5 jaar zijn ze volledig op kleur.

Biotoop: bossen, velden, veel soorten zelfs in bewoonde plaatsen.

Holenbroeder.

Snelle vliegers, maar toch ook goede klauteraars.

Voeding: Zaden, granen en vruchten.

Binnen het geslacht *Psittacula* worden naast de *Psittacula manillensis* de volgende soorten en ondersoorten onderscheiden:

Grote Alexanderparkiet

P. e. eupatria

P. e. nipalensis

P. e. magnirostris

P. e. avensis

P. e. siamensis

Psittacula eupatria

Grote Alexanderparkiet

Nepal-Alexanderparkiet

Andamanen-Alexanderparkiet

Birma-Alexanderparkiet

Laos-Alexanderparkiet

Seychellenedelparkiet †

Uitgestorven

Psittacula wardi †

Afrikaanse halsbandparkiet *Psittacula krameri*

P. k. krameri

P. k. parvirostris

Afrikaanse halsbandparkiet

Abessijnse halsbandparkiet

Mauritiusparkiet

Psittacula echo

Rodriguez-edelparkiet †

Uitgestorven

Psittacula exsul †

Réunion-edelparkiet †

Uitgestorven

Psittacula eques †

Pruimenkopparkiet

Psittacula cyanocephala

Rozekopparkiet <i>P. r. roseata</i> <i>P. r. juneae</i>	<i>Psittacula roseata</i> Rozekopparkiet Birma-rozekopparkiet
Grijskopedelparkiet	<i>Psittacula himalayana</i>
Finsch-edelparkiet	<i>Psittacula finschii</i>
Malabar- of duifparkiet	<i>Psittacula columboides</i>
Layardparkiet	<i>Psittacula calthropae</i>
Derbyparkiet	<i>Psittacula derbiana</i>
Java-baardparkiet <i>P. a. alexandri</i> <i>P. a. kangeanensis</i> <i>P. a. dammermani</i>	<i>Psittacula alexandri</i> Java-baardparkiet Kangean-baardparkiet Dammerman-baardparkiet
Rozeborst-baardparkiet <i>P. f. fasciata</i> <i>P. f. perionca</i> <i>P. f. major</i> <i>P. f. cala</i> <i>P. f. abbotti</i>	<i>Psittacula fasciata</i> Rozeborst-baardparkiet Nias-baardparkiet Babi-baardparkiet Simeulue-baardparkiet Andamanen-baardparkiet
Nicobarenparkiet	<i>Psittacula caniceps</i>
Malakkaparkiet – langstaartparkiet <i>P. l. longicauda</i> <i>P. l. defontainei</i>	<i>Psittacula longicauda</i> Malakkaparkiet - langstaartparkiet Natuna -langstaartparkiet
Nicobaren-langstaartparkiet <i>P. n. nicobarica</i> <i>P. n. tytleri</i>	<i>Psittacula nicobarica</i> Nicobaren-langstaartparkiet Andamanen-langstaartparkiet
Engganoparkiet	<i>Psittacula modesta</i>

Niet opgenomen soorten in deze standaard:

Er zijn soorten niet in deze standaard opgenomen. Drie ervan omdat ze helaas zijn uitgestorven en de hiernavermelde omdat ze niet gehouden worden in Europa en er te weinig gegevens over gekend zijn.

Wel geven we een korte omschrijving van deze soorten. Indien men een van de laatste soorten tegenkomt dan verzoeken wij contact op te nemen met de keurmeesters vereniging sectie parkieten en/of werkgroep edelparkieten.

Niet in Europa gehouden soorten:

Andamanen-Alexanderparkiet - *Psittacula eupatria magnirostris* (Ball 1872)

Deze soort is duidelijk groter dan de grote Alexanderparkiet. Formaat 64 cm. Het groen van de lichaamsbevedering is heel zuiver en zonder grauwwitte waas. Heeft in de nek een brede roze band, bijna zonder blauwe kleur.

Birma-Alexanderparkiet - *Psittacula eupatria avensis* (Kloss 1917)

Deze soort verschilt van de grote Alexanderparkiet op volgende punten. De lichaamsbevedering is groen zonder grijze waas, soms naar geelgroen neigend. De blauwe waas op de wangen is bijna niet te zien. De rozekleurige halsband is smal.

Mauritiusparkiet - *Psittacula echo* (A. Newton & E. Newton 1876)

Deze zeer zeldzame soort komt alleen voor op het eiland Mauritius. Lijkt erg veel op de Afrikaanse halsbandparkiet. Is met zijn 42 cm iets forser en is wat donkerder van kleur. De zwarte halsband van de man is ook wat breder. De bovensnavel van de man is donkerrood met een gele punt en de ondersnavel is zwart. De pop heeft een zwarte snavel, een iets kortere staart en een geelgroene nekband.

Nias-baardparkiet - *Psittacula fasciata perionca* (Oberholser 1912)

Lijkt veel op de rozeborst-baardparkiet maar is groter. De kopleur is grijs zonder groene of blauwe waas.

Babi-baardparkiet - *Psittacula fasciata major* (Richmond 1902)

Lijkt veel op de rozeborst-baardparkiet, maar verschilt in de borstkleur die wat intensiever is.

Simuelue baardparkiet - *Psittacula fasciata cala* (Oberholser 1912)

Lijkt veel op de rozeborst-baardparkiet maar is wat groter. De buikkleur is groen met een opvallende lichtblauwe waas.

Nicobarenparkiet - *Psittacula caniceps* (Blyth 1846)

Over deze 56 cm grote Nicobarenparkiet is nog zeer weinig gekend. Er zijn geen ondersoorten. Verspreidingsgebied is Kondul, Groot Nicobar en Montshall van de Nicobar-eilanden.

De kop is licht lilagrijs. Ze bezitten een brede baard, een zwarte voorhoofdsband en zijn verder overwegend groen van kleur. De pop heeft een zwarte snavel en de man een rode boven- en zwarte ondersnavel. Verder heeft de pop meer blauw in de kop en is de staart veel korter.

Natuna-langstaartparkiet - *Psittacula longicauda defontainei* (Chasen 1935)

Lijkt erg veel op de Malakkaparkiet. Alleen de rode kopkleur is bij man en pop opvallend intenser.

Nicobaren-langstaartparkiet - *Psittacula nicobarica nicobarica* (Gould 1857)

Over hun leefwijze is nagenoeg niets gekend.

Andamanen-langstaartparkiet – *Psittacula nicobarica tytlery* (Hume 1874)

Over hun leefwijze is nagenoeg niets gekend.

Engganoparkiet - *Psittacula modesta* (Fraser 1845)

Over hun leefwijze is nagenoeg niets gekend.

Uitgestorven soorten:

Seychellenedelparkiet - *Psittacula wardi*

Deze 41 cm grote edelparkiet is begin de twintigste eeuw uitgestorven.

De volwassen man heeft een zwarte band en het achterhoofd is blauw overgoten. Beide geslachten hebben een rode snavel en een roodbruine vleugelvlek.

Meer gegevens ontbreken.

Rodriguez-edelparkiet - *Psittacula exsul*

Deze 40 cm grote edelparkiet is omstreeks 1875 uitgestorven.

Uiterlijk zijn dit zeegroen gekleurde halsband parkieten.

Réunion-edelparkiet – *Psittacula eques*

Laatste melding in 1732.

Er is geen enkel exemplaar bewaard gebleven. Enkel twee tekeningen.

Standaard Edelparkieten

Grote Alexanderparkiet [*Psittacula eupatria*] (Linnaeus 1766)

Algemeen

Van de grote Alexanderparkiet zijn er vijf ondersoorten die qua formaat, grote van de snavel, grote van de schoudervlek, breedte van de nekband en kleurdiepte van elkaar verschillen. Hiervan zijn er twee in deze standaard opgenomen. De andere drie komen zo ver wij weten niet voor bij de kwekers in Europa en/of de onderlinge verschillen zijn te minimaal.

Door onwetendheid hebben kwekers diverse ondersoorten met elkaar vermengd. We vragen bij de mutaties maar één vorm. Tevens is deze keuze gemaakt om de wildvorm en ondersoorten fokzuiver te houden.

De grote Alexanderparkiet komt uit Zuidoost-Azië.

De fysieke standaard geldt ook voor alle ondersoorten.

Grote Alexanderparkiet [*Psittacula eupatria eupatria*] (Linnaeus 1766)

Dit is de nominaatvorm en komt voor in Zuid-India en in Sri Lanka.

De man heeft een grotere en plattere kop. Dit geldt ook voor de ondersoorten. De kleur is bij de grote Alexanderparkiet het helderste groen. De roze nekband is op het breedste punt vijf millimeters breed. Formaat: 58 cm. De pop is iets kleiner door een kortere staart.

Nepal-Alexanderparkiet [*Psittacula eupatria nipalensis*] (Hodgson 1836)

De Nepal-Alexanderparkiet is duidelijk veel groter dan de grote Alexanderparkiet. Ook de snavel is groter en zwaarder dan bij de nominaatsoort. De roze nekband is dieper en breder (acht mm) en ook de schoudervlek is dieper en groter. De lichaamskleur is matter, meer grijsgroen. Het blauw in de nek is sprekender.

Verspreidingsgebied is Oost-Afghanistan, Pakistan, Centraal- en Noord-India, Nepal, Bhutan en Assam.

Formaat: 64 tot 70 cm. De pop is iets kleiner.

Laos-Alexanderparkiet [*Psittacula eupatria siamensis*] (Kloss 1917)

Dit is met zijn 55 cm de kleinste ondersoort en valt direct op door zijn zeer smalle hals- en nekband. Ook de schoudervlek is kleiner. Het rug- en vleugeldekk is vrij heldergroen. De hals, achternek, borst en wangen zijn flink bewaasd.

Verspreidingsgebied is Vietnam, Cambodja, Laos en Noord- en West-Thailand.

Formaat: 55 cm.

Niet omschreven ondersoorten

Andamanen-Alexanderparkiet [*Psittacula eupatria magnirostris*] (Ball 1872)

Deze ondersoort wordt niet gehouden in Europa. Hij valt op door zijn grote plumpe snavel en groot formaat, gelijk aan de Nepal-Alexanderparkiet. Wel is de Andamanen-Alexanderparkiet helderder van kleur, ongeveer gelijk aan de nominaatvorm. Alleen de borst en buik hebben een lichtgrijze waas. Het blauw in de nek is dieper maar ook minder verspreid.

Verspreidingsgebied: alleen op de Andamanen-eilanden.
Formaat: 64 tot 70 cm. De pop is iets kleiner.

Birma-Alexanderparkiet [*Psittacula eupatria avensis*] (Kloss 1917)

Komt veel overeen met de nominaatvorm. De halsband is smaller en de nekband (het roze) is lichter. Ook het blauw in de nek is lichter.
Verspreidingsgebied is Birma.

Fysieke standaard van de grote Alexanderparkiet

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie komt nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking. De vogel heeft een gezonde en levendige uitdrukking, zonder verminkingen of andere gebreken. Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

Deze staat per (onder)soort apart vermeldt. De staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte.

Model:

Een ideale grote Alexanderparkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn. De schouders zijn breed. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot aan de punt van de staart is deze lijn weer recht. Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken.

Houding:

De grote Alexanderparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij van het hout zit. De dijen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is vrij fors maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een iets afgeplatte schedel (vooral bij de man). De snavelbasis is breed. De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden een oogkas.

Poten:

Het loopbeen is recht en stevig, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen zijn voorzien van eenkleurige, gelijkmatig gebogen nagels.

Snavel:

De snavel is krachtig en breed aanzet. De snavel oogt robuust, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar. De staart is relatief lang, gesloten en aan het eind enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door onderstaart dekveren.

Grote Alexanderparkiet, Nepal-Alexanderparkiet en Laos-Alexanderparkiet

Soort Formaat:	Man: Grote Alexanderparkiet 58 cm	Pop: Grote Alexanderparkiet 56 cm	Man: Nepal- Alexanderparkiet 64 tot 70 cm	Pop: Nepal- Alexanderparkiet 64 tot 67 cm	Man: Laos- Alexanderparkiet 55 cm	Pop: Laos- Alexanderparkiet 53 cm
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)
Voorhoofd, wangen en achterkop:	Helder lichtgroen. Groen iets bewaasd. Boven de nekband iets blauwe waas.	Iets doffer dan bij man.	Groen. Groen met grijze waas. Boven de nekband een blauwe waas.	Iets doffer dan bij man.	Heldergroen. Gelijk aan wangen. Boven de nekband een lichtblauwe waas.	Iets doffer dan bij man
Hals en borst.:	Groen, met lichtgrijze waas.	Groen, met zeer lichtgrijsachtige waas.	Groen, met blauwgrijze Waas.	Groen met grijze waas.	Groen met grijze waas.	Gelijk aan de man.
Buik:	Egaal lichtgroen.	Egaal lichtgroen.	Egaal groen.	Egaal groen.	Egaal groen.	
Mantel en onderrug:	Groen met iets blauwgrijze waas.	Gelijk aan de man.	Groen met iets grijze waas.	Gelijk aan de man.	Donkergroen met grijze waas.	Gelijk aan de man.
Stuit:	Heldergroen.		Groen.		Helder diepgroen.	
Hand - en armpennen:	Grijszwart. Buitenvlag diepgroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Grijszwart. Buitenvlag diepgroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Grijszwart. Buitenvlag Diepgroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.
Binnenzijde hand- en armpennen:	Geelgroen.		Geelgroen.		Geelgroen.	
Vleugeldekenen:	Groen iets bewaasd..	Gelijk aan de man.	Groen iets bewaasd.	Gelijk aan de man.	Donkergroen, iets bewaasd.	Gelijk aan de man.
Duimveertjes:	Groen.		Groen.		Donkergroen.	
Middelste staartpennen:	Heldergroen overgaand in blauw, met aan de toppen een geelgroene punt.	Gelijk aan de man.	Groen overgaand in blauw, met aan de toppen een geelgroene punt.	Gelijk aan de man.	Diepgroen overgaand in diep blauw, met aan de toppen een geelgroene punt.	Gelijk aan de man.
Overige staartpennen:	Heldergroen.	Gelijk aan de man.	Groen.	Gelijk aan de man.	Diepgroen.	Gelijk aan de man.
Onderstaart dekenen:	Geel.		Geel.		Geel.	
Bovenstaart dekenen:	Heldergroen.	Gelijk aan de man.	Groen.	Gelijk aan de man.	Helder Diepgroen.	Gelijk aan de man.
Snavel:	Dieprood met iets lichte punt. Ondersnavel rood.	Gelijk aan de man.	Dieprood met iets lichte punt. Ondersnavel rood.	Gelijk aan de man.	Rood met iets lichte punt. Ondersnavel rood.	Gelijk aan de man.
Snavelrand:	Bleek.	Bleek.	Bleek.	Bleek.	Bleek.	Bleek.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.

Soort Formaat:	Man: Grote Alexanderparkiet 58 cm	Pop: Grote Alexanderparkiet 56 cm	Man: Nepal- Alexanderparkiet 64 tot 70 cm	Pop: Nepal- Alexanderparkiet 64 tot 67 cm	Man: Laos- Alexanderparkiet 55 cm	Pop: Laos- Alexanderparkiet 53 cm
Ogen:	Zwart met smalle bleekgele iris. Ooglid bleek roze. Washuid rode ring.	Gelijk aan de man.	Zwart met smalle bleekgele iris. Ooglid bleek roze. Washuid rode ring.	Gelijk aan de man.	Zwart met smalle bleekgele iris. Ooglid bleek roze. Washuid rode ring.	Gelijk aan de man.
Tekening:						
Keel:	Zwart. Onderzijde smalle bleek lichtgroene streep.	Niet van toepassing.	Zwart. Onderzijde smalle bleek groene streep.	Niet van toepassing.	Zwart, kleiner als bij andere soorten. Onderzijde bleekgele streep.	Niet van toepassing.
Teugelstreep:	Grijs.	Grijs.	Diepgrijs.	Grijs.	Donkergroen.	Grijs.
Halsband:	Zwart.	Vaag dof grijs/bruin. Op de plaats van het roze van de man helder lichtgroen.	Zwart.	Vaag dof grijs/bruin. Op de plaats van het diep roze van de man helder groen.	Zwart, smaller dan bij andere soorten.	Vaag dof grijs/bruin. Op de plaats van het zacht roze van de man helder groen.
Nekband:	Roze (5 mm).		Dieproze (8 mm).		Zachtroze (3 mm).	
Schoudervlek:	Donkerrood.	Donkerrood.	Diep donkerrood.	Diep donkerrood.	Donkerrood. Kleiner dan bij andere soorten.	Gelijk aan de man.
Grote vleugelpennen:	Fijne crème omzoming.	Fijne crème omzoming.	Fijne crème omzoming.	Fijne crème omzoming.	Fijne crème omzoming.	Fijne crème omzoming.
Vleugelbocht:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.

Grote Alexanderparkiet mutaties

	Man:	Pop:	Man:	Pop:	Man +Pop:
Mutatie:	Blue - blauw	Blue - blauw	SL ino - lutino	SL ino - lutino	SL ino blue – SL ino blauw - albino
Voorhoofd:	Hemelsblauw.	Gelijk aan de man iets doffer.	Diep geel.	Geel met een witte waas. In de nek dieper geel.	Smetteloos wit.
Wangen en nek:	Blauw met grijze waas.		Geel met witte waas.		
Hals en borst:	Blauw met lichtgrijze waas.	Gelijk aan de man, iets doffer.	Geel met witte waas.	Gelijk aan de man.	Smetteloos wit.
Buik:	Egaal blauw.		Egaal geel.		
Mantel en onderrug:	Blauw met grijze waas.	Gelijk aan de man.	Zacht geel met witte waas.	Gelijk aan de man..	Smetteloos wit.
Stuit:	Hemelsblauw.		Geel.		
Hand -en armpennen:	Grijszwart. Buitenvlag diep blauw, binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Wit. Buitenvlag zachtgeel, binnenvlag wit.	Gelijk aan de man.	Smetteloos wit.
Binnenzijde hand- en armpennen:	Wit met blauwe waas.		Geel.		
Vleugeldekenen:	Blauw met iets grijze waas.	Gelijk aan de man.	Diep geel met iets witte waas.	Gelijk aan de man.	Smetteloos wit.
Duimveertjes:	Blauw.		Diepgeel.		
Middelste staartpennen:	Hemelsblauw overgaand in diepblauw. De toppen wit.	Gelijk aan de man.	Diepgeel overgaand in zachtgeel. De toppen wit over.	Gelijk aan de man.	Smetteloos wit.
Overige staartpennen:	Hemelsblauw.	Gelijk aan de man.	Geel.	Gelijk aan de man.	Smetteloos wit.
Onderstaart dekveren:	Blauw grijsachtig wit		Diepgeel		
Bovenstaart dekveren:	Hemelsblauw.	Gelijk aan de man.	Diepgeel.	Gelijk aan de man.	Smetteloos wit.
Snavel:	Dieprood met lichte punt, ondersnavel rood.	Gelijk aan de man.	Dieprood met lichte punt, ondersnavel rood.	Gelijk aan de man.	Dieprood met lichte punt, ondersnavel rood.
Snavelrand:	Bleek.	Bleek.	Bleek.	Bleek.	Bleek.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.

	Man:	Pop:	Man:	Pop:	Man +Pop:
Mutatie:	Blue - blauw	Blue - blauw	SL ino - lutino	SL ino - lutino	SL ino blue – SL ino blauw - albino
Ogen:	Zwart met smalle bleke iris. Ooglid bleekroze. Washuid rode ring.	Gelijk aan de man.	Rood met smalle bleke iris. Ooglid bleekroze. Washuid rode ring.	Gelijk aan de man.	Rood met smalle bleke iris. Ooglid bleekroze. Washuid rode ring.
Tekening:					
Keel:	Zwart, onderzijde witte rand.	Niet van toepassing.	Wit.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing. Door de andere structuur van de veer wel vaag wit waarneembaar.
Teugelstreep:	Grijs.	Grijs.	Donkergeel.	Donkergeel.	Zie keel.
Halsband:	Zwart.	Vaag dof grijs/blauw.	Wit.	Vaag diepgeel.	Zie keel.
Nekband:	Wit (7 mm).	Op de plaats van het wit bij de man nu helder hemelsblauw.	Dieproze (7 mm).	Op de plaats van het dieproze van de man nu okergeel.	Niet van toepassing.
Schoudervlek:	Lichtgrijs.	Grijs.	Dieproze.	Dieproze.	Niet van toepassing
Grote vleugelpennen:	Fijne witte omzoming.	Fijne witte omzoming.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelbocht:	Wit.	Wit.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.

Keurtechnische aanwijzingen bij de grote Alexanderparkiet, Nepal-Alexanderparkiet en Laos-Alexanderparkiet

Grote Alexanderparkiet

Let vooral op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels worden bestraft. Het missen van een of meer nagels is een veel voorkomende fout. De snavel is gaaf.

Bij kleur er rekening mee houden dat de kleuren bij de edelparkieten niet de helderheid en intensiteit hebben van de andere kromsnavels. Waar wel op bestraft wordt is een zwarte omzoming van het vleugel- en rugdek, wat een vlekkerige kleur veroorzaakt. Dit is in de eerste plaats een bevederingsfout. De kleurafscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding. De nagels zijn eenkleurig. De keeltekening en de halsband hebben een regelmatig verloop en mogen niet te iel zijn.

Het roze en blauw van de nekband is zo diep mogelijk. De pop is matter van kleur. Ze dient wel zo egaal mogelijk van rug- en vleugeldekk te zijn. De schoudervlek is donkerrood en strak afgelijnd aan de onderzijde. Hieraan enige soepelheid geven. Een vlekkerige of niet complete en te kleine schoudervlek wordt streng gestraft bij tekening. Dit duidt op hybride kenmerken met de halsbandparkiet. Hybriden zijn te herkennen aan de vage schoudervlek. Ook zijn het formaat/model en de snavelvorm meestal een tussenvorm. Dit wordt streng bestraft, met een maximum van 85 punten.

Regelmatig zien we grote Alexanderparkieten die groter zijn dan 58 cm, zelfs tot 60 cm. Mits de juist gevraagde kleur en tekeningomschrijving dit niet bestraffen. Worden ze echter groter dan keuren als Nepal Alexanderparkiet en bestraffen aan de hand van de standaard.

De pop is gelijk van model, alleen iets kleiner van formaat door de iets kortere staart. Ook is ze in het geheel matter van kleur.

De man krijgt pas in het derde levensjaar zijn volledige kleur en nekband. Indien de man een gedeeltelijke nekband toont, dan wordt dit bestraft bij tekening.

Nepal-Alexanderparkiet

Het grootste verschil met de nominaatvorm is het formaat. Er kan wel een verschil zijn van tien cm. Ook de bovensnavel is veel forser van vorm. Het roze in de nek is veel dieper en breder, evenals de schoudervlek. De lichaamskleur is ook veel meer bewaasd, met een grijsgroenachtige kleur, vooral in de wangen, rug/mantel en borst. Alleen het voorhoofd is helder lichtgroen van kleur. De lichaamskleur is zo egaal mogelijk en mag niet vlekkerig overkomen. De schoudervlek is strak afgelijnd, vooral aan de bovenzijde. De onderzijde wordt met enige soepelheid beoordeeld.

Zie ook keurtechnische aanwijzingen van de grote Alexanderparkiet.

Laos-Alexanderparkiet

De Laos-Alexanderparkiet is nog een zeer zeldzame verschijning in Europa. Toch komt hij hier al voor. Vandaar de opname in deze standaard. Hij valt direct op door zijn kleiner formaat en toch vrij grove snavel. Ook de nek- en halsband zijn opvallend smal. Dat mag niet bestraft worden omdat dit een typisch kenmerk is van de Laos-Alexanderparkiet. Ook de schoudervlek is kleiner en helderder rood. Verder gelijk aan de grote Alexanderparkiet.

Keurtechnische aanwijzingen bij de mutaties van de grote Alexanderparkiet

Hier worden de ondersoorten niet apart gevraagd. Alleen de nominaatvorm, eventueel groter door de inkweek van de Nepal-Alexanderparkiet, is toegestaan.

Blue - blauw:

Door het volledig ontbreken van het psittacine in de bevedering kleuren de vervelden die normaal groen zijn, blauw. De rode, oranje en gele veervelden worden wit. Het zwart eumelanine is niet gewijzigd.

De grijze waas zoals die bij de wildvorm gevraagd wordt is ook bij blauw aanwezig. De kleur is zo diep en egaal mogelijk en komt niet vlekkelig over. De kopkleur is het diepst blauw. De halsband is strak afgelijnd, evenals de witte nekband. De schoudervlek is grijs van kleur en is ook zo egaal mogelijk. De snavelkleur is rood gebleven.

Speciaal letten op formaat, model en fokzuiverheid. Er mogen geen halsbandparkiet kenmerken zichtbaar zijn. Dit is vooral te zien aan de kop/snavelvorm en de grote van de schoudervlek.

De pop is in het geheel matter van kleur.

Blauw vererft autosomaal recessief.

Zie ook keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.

SL ino - lutino

Bij de SL ino - lutino is al het eumelanine verdwenen. Hierdoor ontstaat er een gele vogel. Ook de oogkleur is gewijzigd, deze is nu rood.

Let speciaal op model en formaat. Het is een volle vogel en de borst mag niet ingevallen zijn. De lichaamskleur is niet geheel egaal geel. De oorspronkelijk grijze waas is nu wit bewaasd. Er mag geen groene waas zichtbaar zijn. Alleen het voorhoofd, de buik, stuit en staart zijn diep egaal geel. De vleugelpennen zijn wit met een zachtgele waas. Wel geniet de diepst gekleurde parkiet de voorkeur. De rode schoudervlek is ook zo strak mogelijk en is ook van juiste grootte. Wel hier enige soepelheid toepassen. Vaak is er op het vleugeldeuk nog wat rood. Dit is bij de wildvorm gemaskeerd. De strakst afgelijnde vogel geniet de voorkeur. De halsband bij de man is wit. De koptekening van de man is zo strak mogelijk. Ook is de lichaamskleur bij zowel de man als de pop schoon zonder vuile aanslag.

Ook hier streng letten op de zuiverheid en het ontbreken van hybridekenmerken.

SL ino - lutino vererft geslachtsgebonden recessief.

Zie ook keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.

SL ino blue – SL ino blauw (albino)

SL ino blue is een combinatie van de mutaties SL ino en blue waarbij zowel het psittacine als het eumelanine verdwenen zijn.

Moet een brede forse vogel zijn, zonder smalle borst of openstaande vleugels.

Als de vogel in goede conditie is zal deze smetteloos wit zijn zonder enige vuile aanslag. Soms toont de SL ino blauw een blauwe of grijze aanslag. Dit is een kleurfout. De staart is volledig en smetteloos wit.

Door de vederstructuur zien we vooral bij de man een vage witte halsband. Deze mag geen bruine waas tonen. Dat is een kleurfout.

Zie ook keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.

Noot:

Bij zowel SL ino als SL ino blue zien we al regelmatig grote Alexanderparkieten met een vage keeltekening. Ook de lichaamskleur is meer gebroken wit bij SL ino blue.

Het betreft hier een mutatiecombinatie, waarvan nog niet met 100% zekerheid is vastgesteld of het een combinatie is van dit misty of recessief grijs met SL ino.

Wanneer men dit soort vogels ter keuring aanbiedt, deze voorlopig keuren als een mutatiecombinatie. Het aanwezig zijn van de keeltekening bij de man mag niet bestraft worden.

Niet beschreven en of bewezen, maar al wel ontstaande mutaties zijn bij de grote Alexanderparkiet:

- Greygreen - grijsgroen
- Grey - grijs
- Darkfactor – donkerfactor
- Violet factor
- Cinnamon
- Clearface fallow – bleekkop fallow
- Misty
- Turquoise
- Pied – bont
- Marbled of spangle
- ...

Deze mutaties zijn nog zo zeldzaam en van een aantal zijn de mannen nog niet helemaal op kleur zodat het nu nog te vroeg is om ze op te nemen in de standaard. Zodra het aantal toeneemt en er meer gegevens over gekend zijn zal dit gebeuren.

Afrikaanse halsbandparkiet [*Psittacula krameri krameri*] (Scopoli 1769)

Algemeen

Herkomst: West-Afrika, Senegal, Oeganda en Zuid-Soedan.

Formaat: 40 cm.

De fysieke standaard van de Afrikaanse halsbandparkiet

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie komt nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking. De vogel geeft een gezonde en levendige indruk zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden t en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte van de Afrikaanse halsbandparkiet is 40 cm. De staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Afrikaanse halsbandparkiet is een slanke vogel in vergelijking met de Indische halsbandparkiet. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn smal. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

De Afrikaanse halsbandparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van het hout. De dijen zijn zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, is niet grof maar past wel bij het postuur. De kop is rond en bol. De snavelbasis is smal. De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weersijden de oogkas.

Poten:

Het loopbeen is recht, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen zijn voorzien van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel is smal. De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar. De staart is relatief lang, gesloten en aan het einde enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Soort	Man: Afrikaanse halsbandparkiet	Pop: Afrikaanse halsbandparkiet	Man: Indische halsbandparkiet	Pop: Indische halsbandparkiet
Formaat:	40 cm	39 cm	42 cm	41 cm
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)
Voorhoofd en wangen:	Helder lichtgroen.	Grasgroen, iets donker dan bij de man.	Helder lichtgroen.	Lichtgroen, donker dan bij de man.
Achterkop:	Groen met blauwe was.		Groen met hemelsblauwe was.	
Hals en borst:	Grasgroen.	Grasgroen.	Groen, lichtgrijs Bewaasd.	Groen, zeer licht grijsachtig bewaasd.
Buik:	Egaal grasgroen.	Egaal grasgroen.	Egaal lichtgroen.	Egaal lichtgroen.
Mantel en onderrug:	Grasgroen.	Grasgroen.	Groen met iets grijze aanslag.	Groen met iets grijze was.
Stuit:	Helder grasgroen.	Helder grasgroen.	Heldergroen.	Heldergroen.
Hand- en armpennen:	Donkergroen. Buitenvlag diep groen. Binnenvlag zwartgrijs. Binnenzijde geelgroen.	Donkergroen. Buitenvlag grasgroen. Binnenvlag donkergroen. Binnenzijde geelgroen.	Grijszwart. Buitenvlag diepgroen. Binnenvlag zwartgrijs. Binnenzijde geelgroen.	Grijszwart. Buitenvlag diepgroen. Binnenvlag zwartgrijs. Binnenzijde geelgroen.
Vleugel dekveren:	Groen, iets bewaasd. Duimveertjes groen.	Grasgroen, iets bewaasd. Duimveertjes groen.	Groen iets bewaasd. Duimveertjes groen.	Groen iets bewaasd. Duimveertjes groen.
Middelste staartpennen:	Heldergroen, overgaand in blauw met een geel puntje.	Heldergroen, overgaand in blauw met een geel puntje.	Heldergroen, overgaand in blauw met een geelgroen puntje.	Heldergroen, overgaand in blauw met een geelgroen puntje.
Overige staartpennen:	Heldergroen.	Heldergroen.	Heldergroen.	Heldergroen.
Onderzijde:	Geelgroen.	Geelgroen.	Geelgroen.	Geelgroen.
Onderstaart dekveren:	Groen.	Groen.	Groen.	Groen.
Bovenstaart Dekveren:	Heldergroen.	Groen.	Heldergroen.	Groen.
Snavel:	Donkerrood met zwarte was en snavelpunt. Ondersnavel zwart.	Donkerrood met zwarte was en snavelpunt. Ondersnavel zwart.	Dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.	Dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.

Soort	Man: Afrikaanse halsbandparkiet	Pop: Afrikaanse halsbandparkiet	Man: Indische halsbandparkiet	Pop: Indische halsbandparkiet
Nagels:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Ogen:	Zwart met smalle bleke iris.	Zwart met smalle bleke iris.	Zwart met smalle bleke iris.	Zwart met smalle bleke iris.
Tekening:				
Voorhoofdsband:	Zwart.	Grijsgroen.	Zwart.	Grijsgroen.
Keel:	Zwart.	Niet van toepassing.	Zwart.	Niet van toepassing.
Hals/nekband:	Zwart, in de nek overgaand in diep roze. Boven de nekband een smalle blauwe rand.	Vaag groen.	Zwart, in de nek overgaand in diep roze.	Dof grijs/bruin. Op de plaats van het roze van man lichtgroen.
Vleugelpennen:	Slagpennen met fijne crème zoom.	Slagpennen met fijne crème zoom.	Slagpennen met fijne crème zoom.	Slagpennen met fijne crème zoom.
Vleugelbocht:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Ooglid:	Roze.	Roze.	Bleekroze.	Bleekroze.
Oogring:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.

Keurtechnische aanwijzingen bij de Afrikaanse halsbandparkiet

Afrikaanse halsbandparkiet

Er wordt vooral gelet op model en formaat. Het missen van een of meerdere nagels is een veel voorkomende fout. De snavel is gaaf. Bij kleur wordt er rekening gehouden met het feit dat de kleuren bij de edelparkieten niet de helderheid en intensiteit hebben van de andere kromsnels. De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding. De nagels zijn eenkleurig.

De keeltekening en de nekband bij de man hebben een regelmatig verloop en mogen niet te iel zijn.

Het roze van de nekband is zo diep mogelijk evenals de blauwe waas in de hals. De pop is in het geheel matter van kleur, maar dient wel zo egaal mogelijk te zijn op rug- en vleugeldeksels. De pop mist de nekband. Door een andere vederstructuur ter plaatse is er wel nog een vage groene nekband zichtbaar. De kleur is wat helderder dan de kleur van de kop zelf.

De nekband bij de man is pas in het derde levens jaar volledig op kleur.

Buiten het formaat is de Afrikaanse halsbandparkiet direct te herkennen aan de donkerrode bovensnavel met zwarte punt. Ook is de kop wat ronder van vorm.

Bij het keuren volstaat de vermelding Afrikaanse halsbandparkiet, zonder toevoeging van wildvorm of lichtgroen.

Mutaties zijn niet gekend of er ontbreken voldoende gegevens.

Voor alle duidelijk is de Indische halsbandparkiet in deze standaard naast de Afrikaanse halsbandparkiet geplaatst. Voor de mutaties van de Indische halsbandparkiet verwijzen wij naar deel 1 standaard edelparkieten, waarin de Indische halsbandparkiet volledig is omschreven.

Abessijnse halsbandparkiet [Psittacula krameri parirostris] (Souancé 1856)

Herkomst: Somalië, Ethiopië en Soedan.

Formaat: 40 cm.

Als de Afrikaanse halsbandparkiet, maar de groene lichaamskleur heeft een duidelijke blauwe waas. De snavel is geheel rood en iets kleiner.

Pruimenkopparkiet - Rozekopparkiet - Grijskopedelparkiet – Finsch-edelparkiet

Algemeen

Hoewel het hier om vier aparte soorten gaat, zijn de overeenkomsten zo groot, dat we ze bij elkaar geplaatst hebben.

Vroeger werd de rozekopparkiet als ondersoort van de pruimenkopparkiet gezien. Omwille van de grote overeenkomsten was dit te begrijpen. Nu worden ze als aparte soort, binnen het *geslacht Psittacula*, omschreven.

De soorten worden eerst ieder apart met eventuele ondersoorten algemeen omschreven. Voor de fysieke standaard geldt dit voor de vier soorten tegelijk.

Pruimenkopparkiet [Psittacula cyanocephala] (Linnaeus 1766)

De pruimenkopparkiet is wel de bekendste en binnen deze groep de meest gehouden soort. Hij heeft als verspreidingsgebied Sri Lanka, Rameswaram-eiland, India, Oost-Pakistan en vanaf Nepal tot aan Bhutan.

Er zijn geen ondersoorten van de pruimenkopparkiet.

De man valt direct op met zijn "pruimenrode" kopkleur. Deze is bij de pop grijs. De toppen van de staart zijn bij beide geslachten wit. De pop is wat doffer van kleur en mist de zwarte nekband, blauwe waas en schoudervlek.

Bij de pruimenkopparkiet zijn er diverse mutaties opgetreden, waarvan er al een aantal in deze standaard zijn opgenomen.

Formaat: man 34 cm; pop 33 cm.

Rozekopparkiet [Psittacula roseate] (Biswas 1951)

Rozekopparkiet [Psittacula roseata roseata] (Biswas 1951)

Verspreidingsgebied: Noord-Birma, Assam, Oost-Pakistan en Bangla Desh.

De rozekopparkiet lijkt erg veel op de pruimenkopparkiet. De roze kop is het duidelijkste verschil. Ook missen ze de blauwe waas in de nek. De lichaamskleur is wat lichter en de toppen van de staart, die iets korter zijn, is geel in plaats van wit zoals bij de pruimenkopparkiet. Ook het formaat is een stuk kleiner dan dat van de pruimenkopparkiet. Zowel man als pop bezitten de schoudervlek, deze is ook iets groter dan bij de pruimenkopparkiet.

De pop is iets kleiner door een kortere staart.

Er zijn nog geen mutaties bekend van de rozekopparkiet. Er zou een lutino zijn ontstaan, maar wij denken dat het hier om een lutino grijskopedelparkiet gaat.

Formaat: Man 30 cm; Pop 28 cm.

Birma rozekopparkiet [Psittacula roseata juneae] (Biswas 1951)

Deze ondersoort met het verspreidingsgebied vanaf Zuid-Assam, Birma, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam is niet in deze standaard opgenomen wegens de minimale verschillen met de nominaatvorm.

Het verschil is dat ze in het geheel iets lichter zijn, en dat de schoudervlek iets groter is.

Grijskopedelparkiet [Psittacula himalayana himalayana] (Lesson 1832)

Heeft als verspreidingsgebied Zuidoost-Azië vanaf oostelijk Afghanistan door Pakistan en Noord-India tot Nepal.

Heeft zoals de naam al zegt een grijze kop. Wordt ook wel foutief zwartkopparkiet genoemd. Lijkt ~~verder~~ veel op de pruimenkopparkiet. Hij is wel groter van formaat door de lange staart. Opvallend bij de grijskopparkiet is de staartkleur. Deze is op het uiteinde zeven cm geel en wordt ook wat breder op het einde.

De pop is wat doffer van kleur en mist de bruinrode schoudervlek.
Formaat: 40 cm.

Finsch-edelparkiet [Psittacula himalayana finschii] (Hume 1874)

Deze soort heeft als verspreidingsgebied van Nepal naar Thailand, Birma, Vietnam en Zuidwest-China. Heeft toch opvallende verschillen ten opzichte van de grijskopedelparkiet en is daarom ook in deze standaard opgenomen.

De Finsch-edelparkiet heeft een kleiner lichaam. Maar is door de veel langere staart gelijk van lengte (40 cm) met de grijskopedelparkiet. Het uiteinde van de staart wordt ook niet breder en is vuilwit/bleekgeel in plaats van geel van kleur. Ook de snavelkleur is dieper.

Ook hier mist de pop de bruinrode schoudervlek.

Formaat: 40 cm.

Fysieke standaard van de pruimenkopparkiet, rozekopparkiet, grijskopedelparkiet en Finsch-edelparkiet

Wij verwijzen hier naar de fysieke standaard van de Afrikaanse halsbandparkiet. Deze is, op het formaat na, geheel gelijk. Dit kan men terug vinden bij algemeen en bij de standaard zelf.

Rozekopparkiet, grijskopedelparkiet en Finsch-edelparkiet

Soort	Man: Rozekopparkiet	Pop: Rozekopparkiet	Man: Grijskopedelparkiet	Pop: Grijskopedelparkiet	Man: Finsch-edelparkiet	Pop: Finsch-edelparkiet
Formaat:	30 cm	28 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)
Kop:	Roze, achterkop meer lila.	Grijs, met iets lila waas.	Helder donkergrijs blauwe schijn.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Gelijk aan de man.
Nek:	Egaal helder lichtgroen.	Geelgroen.	Egaal helder lichtgroen.	Egaal helder lichtgroen.	Groen met gele waas.	
Hals en borst. Buik en onderlijf:	Egaal helder lichtgroen.	Egaal lichtgroen, iets matter dan bij man.	Lichtgroen.	Lichtgroen.	Groen met gele waas.	Gelijk aan de man.
Mantel en onderrug:	Groen, iets bewaasd.	Gelijk aan de man, iets doffer.	Groen iets gele waas.	Groen met iets bruine waas.	Donker geelgroen met bruine waas.	Gelijk aan de man, iets doffer.
Stuit:	Helder lichtgroen.		Groen.	Groen.	Groen.	
Hand - en armpennen:	Grijszwart overgaand in diep groene toppen. Buitenvlag diepgroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Grijszwarte bovenrand, verder diepgroen. Buitenvlag diepgroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man, iets donkerder.	Donkergroen met grijszwarte toppen. Buitenvlag donkergroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.
Vleugeldeken:	Groen iets omzoomd.	Gelijk aan de man.	Groen iets omzoomd.	Groen iets bruine waas.	Groen met bruine waas.	Gelijk aan de man
Middelste staartpennen:	Heldergroen overgaand in diep blauw met gele toppen.	Gelijk aan de man, iets minder diep blauw.	Kobaltblauw, half weg overgaand in geel (7 cm).	Diep kobaltblauw, halfweg overgaand in geel.	Violet, overgaand in zachtgeel/vuilwit, de toppen weer dieper geel.	Gelijk aan de man.
Overige staartpennen:	Lichtgroen overgaand in blauwe waas met gele toppen.	Gelijk aan de man.	Groen, met brede gele rand en toppen.	Diepgroen, met brede gele rand en toppen.	Groen met gele toppen.	Gelijk aan de man.
Onderstaart dekveren:	Groen.		Groen.	Groen.	Geelgroen.	
Bovenstaart dekveren:	Helder lichtgroen.	Gelijk aan de man.	Groen.	Diepgroen.	Lichtgroen.	Gelijk aan de man.

Soort	Man: Rozekopparkiet	Pop: Rozekopparkiet	Man: Grijskopedelparkiet	Pop: Grijskopedelparkiet	Man: Finschedelparkiet	Pop: Finschedelparkiet
Snavel:	Okergeel met iets donkere punt. Oondersnavel zwart .	Bleekgeel met iets donkere punt. Oondersnavel donkergrijs.	Oranjerood met gele punt, ondersnavel geel.	Licht oranjerood met gele punt. Oondersnavel geel.	Oranjerood met gele punt. Oondersnavel geel.	Okergeel met gele punt. Oondersnavel geel.
Snavelrand/Neusdop:	Bleek.	Bleek.	Hoornkleurig..	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart, met bleekgele iris.	Gelijk aan de man.	Zwart, met flets gele iris.	Gelijk aan de man.	Zwart, met flets gele iris.	Gelijk aan de man.
Tekening:						
Keel:	Zwart.	Niet van toepassing.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Nekband:	Zwart. Aan kopzijde een lila rand vanaf de snavel.	Okergele rand.	Zwart. Onderzijde een zeegroene rand.	Zwart.	Zwart. Onderzijde een helder zeegroene rand.	Zwart.
Schoudervlek:	Bruinrood.	Bruinrood.	Bruinrood.	Geen, soms vaag waarneembaar.	Bruinrood.	Niet van toepassing.
Slagpennen:	Fijne bleekgele omzoming.	Fijne bleekgele omzoming.	Fijne bleke omzoming.	Fijne bleke omzoming.	Fijne lichtgroene omzoming.	Fijne lichtgroene omzoming.

Pruimenkopparkiet mutaties

Pruimenkopparkiet: wildvorm en mutaties						
	Man:	Pop:	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Formaat:	34 cm	33 cm	34 cm	33 cm	34 cm	33 cm
Kleur/mutatie:	(wildvorm)	(wildvorm)	Greygreen - grijsgroen	Greygreen - grijsgroen	Cinnamon	Cinnamon
Kop:	Paars/rood. Achterkop meer paars.	Grijs met blauwe waas.	Diep rood. Achterkop grijs bewaasd.	Grijs.	Helder paars/rood. Achterkop met paars .	Lichtgrijs.
Nek:	Turquoise.	Olijfgroen met gele waas.	Licht grijsgroen.	Grijsgroen.	Geelgroen.	Groen met bruine waas.
Hals en borst:	Geelgroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.	Grijs/geelgroen.	Diep Geelgroen.	Lichtgroen.
Buik en onderlijf:	Groen.	Groen.	Olijfgroen.	Olijf /geelgroen.	Geelgroen.	Geelgroen.
Mantel /onderrug:	Geelgroen iets bewaasd.	Olijfgroen met gele waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Gelijk aan de man, iets doffer.	Geelgroen met bruine waas.	Gelijk aan de man, iets doffer.
Stuit:	Groen.	Groen.	Grijsgroen.		Zeegroen.	
Hand- en armpennen:	Donker groen, naar de toppen overgaand in zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Grijsgroen, naar de toppen overgaand in zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Groen, naar de toppen overgaand in bruingrijs.	Gelijk aan de man.
Vleugeldeken:	Diepgroen.	Gelijk aan de man.	Grijsgroen.	Gelijk aan de man.	Bij schouders zeegroen, overgaand in groen met bruine waas.	Gelijk aan de man.
Middelste staartpennen	Diep kobaltblauw, met witte toppen.	Gelijk aan de man.	Zwartgrijs met crèmekleurige toppen.	Gelijk aan de man.	Kobaltblauw, met grijze waas. Buitenzijde lichter. De toppen crèmekleurig.	Gelijk aan de man.
Overige staartpennen:	Groen met gele toppen.	Gelijk aan de man.	Grijsgroen met gele toppen.	Gelijk aan de man.	Lichtgroen met gele toppen.	Gelijk aan de man.
Onderstaart deken:	Lichtgroen.		Geel/grijsgroen.		Geelgroen.	
Bovenstaart deken:	Lichtgroen.	Gelijk aan de man.	Grijsgroen.	Gelijk aan de man.	Geelgroen.	Gelijk aan de man.
Snavel:	Okergeel. Onder de snavel bruinzwart.	Bleekgeel. Onder de snavel grijs.	Okergeel. Onder de snavel bruinzwart.	Bleekgeel. Onder de snavel grijs.	Okergeel. Onder de snavel bruin.	Bleekgeel. Onder de snavel bruingrijs.
Snavelrand en neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.

Pruimenkopparkiet: wildvorm en mutaties						
	Man:	Pop:	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Zwart, iris geel/wit.	Zwart, iris geel /wit.	Zwart, iris geel/wit.	Zwart, iris geel/wit.	Donkerbruin, iris geel/wit.	Donkerbruin, iris geel/wit.
Keel:	Zwart.	Niet van toepassing.	Zwart.	Niet van toepassing.	Zwartbruin.	Niet van toepassing.
Nekband:	Zwart. Onderzijde licht zeegroen.	Lichtgeel.	Zwart. Onderzijde lichtgrijs.	Geel.	Zwartbruin. Onderzijde lichtblauw.	Geel.
Schoudervlek:	Roodbruin.	Niet van toepassing.	Roodbruin.	Niet van toepassing.	Helder roodbruin.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Fijne lichtgroene omzoming.	Gelijk aan de man.	Fijne licht grijsgroene omzoming.	Gelijk aan de man.	Fijne geelgroene omzoming.	Gelijk aan de man.

Keurtechnische aanwijzingen bij de pruimenkopparkiet, rozekopparkiet, grijskopedelparkiet en Finsch-edelparkiet

Pruimenkopparkiet

De pruimenkopparkiet is een vrij algemene verschijning op de vogeltentoonstellingen. Er wordt dan ook goed op formaat en model gelet. Iele en/of te smalle vogels worden streng gestraft. Een goede conditie is een eerste vereiste om voor een hoge waardering in aanmerking te komen. Het missen van een of meerdere nagels is ook een veel voorkomende fout. De kleur is helder en egaal en mag niet vlekkerig overkomen. Het vleugeldek is harder groen gekleurd dan de borst en rugdek, waar een waas over zit. De zwarte nekband is strak afgelijnd en niet te smal/fijn. De schoudervlek heeft de vorm van een driehoek en is strak.

De pop heeft een paarsgrijze kop en mist de zwarte nekband. De pop bezit wel een gele nekband die uitvloeit in de nek/rugdek. De pop mist ook de schoudervlek. Het iets tonen van de schoudervlek is een kleurfout.

De man is pas na het tweede jaar volledig op kleur.

Jonge vogels hebben een grijsgroene kopkleur met een gele kraag in de nek en zijn veel doffer van kleur. Ook de staart is veel korter.

In de vroegere literatuur worden vier ondersoorten genoemd. In de recente literatuur worden deze ondersoorten als aparte soorten omschreven. De pruimenkopparkiet en de rozekopparkiet worden inmiddels als twee aparte soorten gezien. Hetzelfde geldt voor de grijskopedelparkiet en de Finsch-edelparkiet. Deze komen aan de grenzen van hun verspreidingsgebieden samen voor zonder te hybrideren. Dat geldt algemeen als kenmerk van het twee zelfstandige soorten zijn (Adri van Kooten, Papegaaien en parkieten, 2013).

Zie verder ook de andere edelparkieten.

Rozekopparkiet

De rozekopparkiet ziet men nog niet veel op vogeltentoonstellingen. Hij lijkt erg veel op de pruimenkopparkiet, met een roze in plaats van een paarsrode kopkleur. Hij is ook wat kleiner van formaat. Hiermee ook rekening houden bij het keuren. Dit wil niet zeggen dat het model ook automatisch minder is. Het model geeft een volle indruk en de ruglijn is recht. De kleur is helderder groen dan bij de pruimenkopparkiet en de rozekopparkiet mist de zeegroene kleur in de nek.

Deze is heldergroen. Ook de staarttoppen zijn bij de rozekopparkiet geel, die bij de pruimenkopparkiet wit van kleur zijn.

De pop is iets kleiner van formaat, mist de zwarte nekband en de kopkleur is grijs met iets lila waas. De pop bezit wel de bruinrode schoudervlek.

Zoals bij alle edelparkieten goed letten op de nagels, die alle aanwezig moeten zijn.

Jonge vogels hebben een groengrijze kopkleur, geen gele hals/nek zoals bij de pruimenkopparkiet, een kortere staart en nog geen schoudervlek. Vaak komen er na de jeugdrui al enkele rode veertjes door, maar pas na twee jaren zijn ze volledig op kleur.

Er zijn nog geen mutaties van de rozekopparkiet.

Grijskopedelparkiet

Ook deze soort is geen alledaagse verschijning op een tentoonstelling. Hij is groter dan een pruimenkopparkiet door de langere staart. Man en pop bezitten beide een grijze kop en een zwarte nekband. Ze zijn ook gelijk van formaat. De pop is wat doffer van kleur en mist de schoudervlek. Indien dit iets aanwezig is dan wordt dit bestraft bij kleur. Ook is de snavelkleur wat lichter bij de pop. Opvallend kenmerk ten opzichte van de Finsch-edelparkiet is dat het uiteinde van de gele staarttoppen opnieuw wat breder wordt.

Jonge vogels hebben een groene kop met wat grijs en de staart is korter.

Verder gelijk aan andere edelparkieten.

Er zijn nog geen mutaties gekend bij de grijskopedelparkiet.

Finsch-edelparkiet

Lijkt veel op de grijskopedelparkiet, maar is kleiner van lichaam. Door een langere staart is de totale lengte precies gelijk aan deze van de grijskopedelparkiet. De staart van de Finsch-edelparkiet is smaller en wordt niet breder op het uiteinde. Ook de kleur is anders. Bij de Finsch-edelparkiet is de overgang van violet naar vuilwit en zijn de toppen geel. Bij de grijskopedelparkiet is dit van kobalt naar geel. De algemene lichaamskleur is wat meer geelgroen en de zeegroene nek is wat lichter.

De pop is wat fletser/doffer van kleur en mist de schoudervlek.

Jonge vogels hebben nog geen grijze kop. Die krijgen ze na het eerste jaar. De staart is korter en de snavel hoornkleurig. Een iets gele snavel duidt vaak op een jonge man. Na twee jaar zijn de vogels volledig op kleur.

Hij moet zeker ook opvallen door zijn zeer lange staart.

Verder gelijk aan andere edelparkieten.

Er is één mutatie bekend van de Finsch-edelparkiet, namelijk NSL ino. Deze mutatie is nog zo zeldzaam dat hij nog niet opgenomen is in de standaard. Bij deze NSL ino is de kop lichtroze met een witte keel en de gehele bovenstaart toont een rode waas op het gele topje na.

Keurtechnische aanwijzingen bij de mutaties van de pruimenkopparkiet

Greygreen – grijsgroen

Greygreen - grijsgroen wordt regelmatig foutief als DD green (olijf) aangeboden. DD green is een groene vogel met een dubbele donkerfactor.

Bij greygreen is de bovenzijde van de staart zwart en bij DD green is dit diep blauw /mauveachtig. De donkerfactor is nog niet ontstaan bij de pruimenkopparkiet.

Er kan dus geen sprake zijn van het bestaan van DD green bij de pruimenkopparkiet.

De kopkleur is dieprood, veel roder dan bij de wildvorm en met een grijze waas in de nek. Onder de zwarte nekband is de kleur grijs bewaasd. De algemene lichaamskleur is grijsgroen. Vooral rond de schoudervlek is de kleur diep grijsgroen.

De pop heeft een grijze kop en is iets doffer van kleur. Greygreen is al bij de kwekers een vrij veel voorkomende mutatie. Op tentoonstellingen zien we ze nog niet zo vaak.

Greygreen - grijsgroen vererft autosomaal dominant.

Verder gelijk aan de wildvorm en overige edelparkieten.

Cinnamon

Cinnamon is een mutatie waarbij, in tegenstelling tot de wildvorm, geen zwarte, maar kaneelbruine eumelanine gevormd wordt.

Ook de onderdons is bruin, wat een lichtere lichaams- en kopkleur tot gevolg heeft. De keel en nekband zijn zwartbruin. De nekband moet qua vorm en breedte wel voldoen aan de eisen van de wildvorm. Vaak is de nekband te smal en niet strak.

De slagpennen zijn zo diep en egaal mogelijk bruin. Regelmatig zien we dat deze pennen tweekleurig en te flets zijn. Dit wordt bijna altijd veroorzaakt doordat de vogels te veel in het zonlicht hebben gezeten, waardoor het eumelanine opbleekt.

De pop heeft een lichtgrijze kopkleur en is iets doffer van kleur.

Cinnamon vererft geslachtsgebonden recessief.

Verder gelijk aan de wildvorm en overige edelparkieten.

Andere mutaties

Van de pruimenkopparkiet zijn er nog mutaties ontstaan. Deze zijn nog zo zeldzaam dat het nog te vroeg is voor een gerichte standaard omschrijving. Er zijn nog

niet voldoende mannen volledig op kleur. Hetzelfde geldt voor de combinatie van de mutaties greygreen met cinnamon.

Niet beschreven primaire mutaties zijn:

- NSL ino – recessief lutino
- SL ino – lutino
- Blue - blauw
- Dilute - overgoten
- Opaline
- Pastel of faded
- Recessive pied - recessief bont
- Dec - gele zwartoog

We zien ook regelmatig een turquoise vogel. Dit is tot nu toe steeds een modificatie gebleken omdat na het tweede jaar de vogels terug de kleur van de wildvorm krijgen.

Bij nieuwe mutaties vragen wij, dit te melden bij de keurmeesters vereniging, ~~sectie~~ parkieten en/of de werkgroep edelparkieten.

Malabarparkiet en Layardparkiet

Algemeen

Malabarparkiet [*Psittacula columboides*] (Vigors 1830)

Verspreidingsgebied: Zuidwest-India. De Malabarparkiet wordt ook wel duifparkiet genoemd.

Er zijn geen ondersoorten van gekend. Ondanks dat de Layardparkiet er vrij veel van weg heeft zit het grote verschil hem in het vleugeldekk. Dit is bij de Malabarparkiet geschubd/gezoomd en bij de Layardparkiet is de vleugelbalk zoals we zien bij de baard- en de Derbyparkiet.

De pop heeft een bredere nekband en mist de zeegroene band onder de zwarte nekband. Ook de borstkleur is bij de pop grijsgroen, die bij de man blauwgrijs is. Formaat: 37 - 38 cm.

Layardparkiet [*Psittacula calthropae*] (Blyth 1849)

Verspreidingsgebied: Sri Lanka. De Layardparkiet wordt ook wel Ceylonparkiet genoemd, de vroegere naam voor Sri Lanka.

Hij is, met zijn 29 cm, de kleinste soort binnen het geslacht *Psittacula* en is erg zeldzaam binnen de avicultuur.

Er zijn geen ondersoorten gekend.

Man en pop zijn nagenoeg gelijk van kleur en tekening. De pop heeft als duidelijkste verschillen een zwarte snavel in plaats van een rode bij de man en minder groen en blauw rond het oog. Ook zijn ze iets donker van kleur.

Formaat: 29 cm.

Malabarparkiet en Layardparkiet:

Soort	Man: Malabarparkiet	Pop: Malabarparkiet	Man: Layardparkiet	Pop: Layardparkiet
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)
Formaat:	37 cm	37 cm	29 cm	29 cm
Kop:	Diep blauwgrijs, voorhoofd en rond het oog.	Grijs, minimaal groen bij het oog.	Grijs, voorhoofd en rond de ogen groen.	Gelijk aan de man. Alleen het groen op het voorhoofd is donkerder.
Nek:	Lichtgroen.		Smaragdgroen.	
Hals en borst:	Blauwgrijs.	Hals grijs, borst grijsgroen..	Smaragdgroen.	Gelijk aan de man, iets lichter.
Buik en onderlijf:	Geelgroen met blauwe waas.	Buik licht grijsgroen.	Groen.	

Soort	Man: Malabarparkiet	Pop: Malabarparkiet	Man: Layardparkiet	Pop: Layardparkiet
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)
Mantel en onderrug:	Blauwgrijs.	Grijs, minder dan bij de man.	Blauwgrijs.	Gelijk aan de man.
Stuit:	Zeegroen.	Zeegroen.	Kobaltgrijs.	
Hand - en armpennen:	Kobaltblauw met zwartgrijze toppen.	Gelijk aan de man.	Groen met grijszwarte toppen. Buitenvlag groen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.
Vleugeldeken:	Donkergroen, bij schouders kobalt/mauve.	Gelijk aan de man.	Groen, bij schouders donkergroen.	Donkergroen.
Middelste staartpennen:	Blauw met gele punt.	Gelijk aan de man.	Diep kobaltblauw met bleekgele punt.	Gelijk aan de man.
Overige staartpennen en onderstaart dekveren:	Groen, met gele punt en buitenvlag.	Gelijk aan de man.	Kobaltblauw met groene buitenvlag.	Gelijk aan de man.
Bovenstaart dekveren:	Zeegroen.	Gelijk aan de man..	Kobaltblauw met grijze waas.	Gelijk aan de man.
Snavel:	Rood met iets gele punt, ondersnavel zwart met rode waas.	Zwart	Oranjerood met gele punt. Ondersnavel zwart.	Zwart.
Snavelrand/Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart met gele iris.	Zwart met gele iris.	Zwart met flets gele iris.	Zwart met flets gele iris.
Tekening:				
Keel (baard):	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Zwart.	Zwart.

Soort	Man: Malabarparkiet	Pop: Malabarparkiet	Man: Layardparkiet	Pop: Layardparkiet
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)
Voorhoofdband:	Blauw/violet.		Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Nekband:	Zwart.Onderzijde een licht zeegroene band.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Hals:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Schoudervlek:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Geelgroen.	Geelgroen, iets helderder dan bij de man.
Vleugeldek:	Scherp bleekgeel gezoomd.	Gelijk aan de man.	Duidelijk lichtgroen gezoomd.	Gelijk aan de man.
Vleugelpennen:	Buitenvlag groen gezoomd.	Minimaal gezoomd.	Fijn lichtgroen gezoomd.	Gelijk aan de man.

Keurtechnische aanwijzingen bij de Malabarparkiet en Layardparkiet

Malabarparkiet

De Malabarparkiet is ook nog vrij zeldzaam op een tentoonstelling, hoewel hij meer wordt gehouden dan de Layardparkiet.

Een goede conditie is een eerste vereiste. Het model is goed vol en de ruglijn loopt vanaf de nekband in een rechte lijn naar de punt van de staart. De kleur van de kop is dieper blauwgrijs dan de borst en mantel. Deze kleur is zo egaal mogelijk. In de blauwe slagpennen is iets groen op de buitenvlag zichtbaar. Ook in de staart zien we groen aan de buitenzijde. De nekband is ongeveer drie millimeters breed en is strak zonder uitlopers. Ook de licht zeegroene band eronder is strak afgelijnd. Elk veertje op het vleugeldek is smal geelgroen gezoomd. Dit vormt een scherpe schubtekening op het vleugeldek. De pop heeft een bredere nekband die ook strak is. De onderzijde is grijs. Het groen bij het oog is vager dan bij de man. De borstkleur is vanaf de hals tot en met de buik egaal grijsgroen. De schubtekening op de vleugels voldoet aan dezelfde eisen als bij de man. De pop heeft een geheel zwarte snavel.

Er zijn nog geen mutaties gekend.

Verder gelijk aan overige edelparkieten.

Layardparkiet

De Layardparkiet is nog zo zeldzaam dat we ze zelden op een vogeltentoonstelling zullen zien. Hoofdzakelijk is het hier een conditiekeuring. De kleur is zo diep mogelijk en egaal. De nekband is vager en smaller dan bij de Malabarparkiet vooral achter in de nek. Het smaragdgroen in de nek is even diep als op de borst. De geelgroene Vleugelbalk is strak afgelijnd. Onder deze vleugelbalk zijn de dekveren lichtgroen omzoomd. De pop is gelijk aan de man maar heeft een zwarte snavel in plaats van een rode en het vleugeldek is iets donkerder. De pop heeft ook minder groen rond de snavel en een iets kleinere kop. Bij de man is de kop iets meer afgeplat. Jonge vogels zijn overwegend groen met een oranje snavel die na vier maanden uitkleurt naar zwartbruin. Na één jaar komen ze op kleur en de mannen krijgen dan de rode snavel terug.

Er zijn nog geen mutaties gekend.

Verder gelijk aan overige edelparkieten.

Derbyparkiet [*Psittacula derbiana*] (Fraser 1852)

Algemeen

Behoort tot de grootste soort binnen het geslacht *Psittacula*. Vooral zijn forse lichaam is opvallend. Ook de paarse borst en buikkleur zijn specifieke kenmerken.

Het verspreidingsgebied is Zuidoost-Azië vanaf Noordoost-Assam door Zuidoost-Tibet tot Zuidwest-China en de provincies Sichuan en Yunnan.

Er zijn geen ondersoorten. Wel kunnen we stellen dat de Derbyparkiet op de borst/buikkleur na erg veel op de baardparkieten lijkt. De pop toont ook de lichte streep in de nek. Ook de geelgroene vleugelbalk bezitten beide soorten.

Formaat: 50 cm; pop 48 cm.

Fysieke standaard van de Derbyparkiet

Is gelijk aan fysieke standaard van de baardparkieten. Alleen het model en de snavel zijn forser.

Derbyparkiet

Soort	Man: Derbyparkiet	Pop: Derbyparkiet
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)
Formaat:	50 cm	48 cm
Kop:	Grijs met paarse waas, voorhoofd meer blauw.	Kobalt/violetachtig. Voorhoofd helderder blauw.
Nek:	Heldergroen.	Heldergroen.
Hals en borst:	Diep paars.	Gelijk aan de man, iets doffer.
Buik en onderlijf:	Paars, onderlijf en dijen groen.	Gelijk aan de man.
Mantel/rugdek:	Donkergroen met lichte waas.	Gelijk aan de man.
Stuit:	Egaal groen.	Gelijk aan de man
Hand- en armpennen:	Donkergroen, met grijszwarte toppen.	Gelijk aan de man.
Vleugel dekveren:	Donkergroen.	Gelijk aan de man.
Middelste staartpennen:	Donkergroen, overgaand in diepblauw. De toppen weer groen.	Gelijk aan de man.

Soort	Man: Derbyparkiet	Pop: Derbyparkiet
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)
Overige staartpennen:	Diepgroen, onderzijde grijs.	Gelijk aan de man.
Onderstaart dekveren:	Groen.	Groen
Bovenstaart dekveren:	Groen.	Groen.
Snavel:	Dieprood met gele punt. Ondersnavel zwart.	Zwart.
Snavelrand-Neusdop:	Hoornkleurig.	
Poten:	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Ogen:	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.
Soort:	Man: Derbyparkiet	Pop: Derbyparkiet
Tekening:		
Keel/baard:	Zwart.	Zwart.
Oogstreep/masker:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Voorhoofdsband:	Zwart	Zwart.
Halsband (pop):	Niet van toepassing.	Lichtroze.
Kop/nek:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Schoudervlek:	Geelgroen.	Geelgroen.
Vleugelpennen:	Bleekgele omzoming.	Gelijk aan de man.

Keurtechnische aanwijzingen bij de Derbyparkiet

De Derbyparkiet is een robuuste en forse vogel. Smalle en iele vogels worden bestraft bij model. De borstkleur is zo diep mogelijk paars van kleur. De buik is een tint lichter en dit zowel bij de man als bij de pop.

Verder is de kleur zo egaal mogelijk. De mantel/rugdek is vooral bij de man wat bewaasd. De nek is heldergroen.

De vleugelbalk is iets minder strak dan bij de baardparkiet. Wel geniet de strakst afgelijnde vogel de voorkeur. De pop heeft buiten de zwarte snavel ook een blauwere kop en een lichtroze halsband. Aan de onderzijde van de baard zien we een kleine inkeping.

Verder gelijk aan de overige edelparkieten.

Er is een mutatie ontstaan, waarschijnlijk gezoomd. Maar hierover moeten eerst meer gegevens gekend zijn, vooraleer deze mutatie in de standaard op te nemen.

Java-baardparkiet [*Psittacula alexandri*] (Linnaeus 1758)

Algemeen

Er zijn drie ondersoorten:

- Java-baardparkiet – *Psittacula alexandri alexandri*;
- Kangeon-baardparkiet – *Psittacula alexandri kangeanensis*;
- Dammerman-baardparkiet – *Psittacula alexandri dammermani*.

De Java-baardparkiet onderscheidt zich van de rozeborst-baardparkiet aan de snavelkleur. De Java-baardparkiet heeft in beide geslachten een geheel rode snavel. De rozeborst-baardparkiet heeft bij de man een rode bovensnavel en een zwarte ondersnavel, terwijl de snavel bij de pop geheel zwart is.

De leefgewoonten zijn gelijk aan die van *P. fasciata*.

Java-baardparkiet [*Psittacula alexandri alexandri*] (Linnaeus 1758)

Dit is de nominaatvorm en komt voor in Java, Bali en het zuiden van Borneo, waar hij waarschijnlijk vanuit Java is ingevoerd.

Formaat: 33 cm.

Dammerman-baardparkiet [*Psittacula alexandri dammermani*] (Chasen en Kloss 1932)

Deze ondersoort komt voor op de Karimundjawa-eilanden in Indonesië.

Formaat: 36 cm.

Kangean-baardparkiet [*Psittacula alexandri kangeanensis*] (Hoogerwerf 1962)

Deze laatst ontdekte ondersoort verschilt maar weinig van Dammerman ondersoort. De snavel is groter en de kop mist de groene waas. De schoudervlekken zijn helderder geel. Het formaat is 35 cm. De snavel is zowel bij de man als de pop rood. Deze ondersoort komt alleen voor op de Kangean-eilanden in Indonesië.

Noot:

Wanneer men deze ondersoorten tegenkomt, verzoeken wij dit te melden bij uw keurmeestervereniging, afdeling grote parkieten, en/of bij de werkgroep edelparkieten. Ze zullen dan opgenomen worden in de standaard.

Java-baardparkiet

Soort	Man: Java-baardparkiet	Pop: Java-baardparkiet
Formaat:	33 cm	33 cm
Kleur:	(Wildvorm)	(Wildvorm)
Kop:	Heldergrijs met blauwe waas.	Heldergrijs met vage blauwe waas.
Nek:	Heldergroen.	Heldergroen.
Hals en borst:	Diep oranje-roze met iets lila waas.	Gelijk aan de man maar iets doffer van kleur.
Buik:	Groen met iets blauwe waas.	
Mantel en onderrug:	Groen met iets grijze waas.	Gelijk aan de man.
Stuit:	Heldergroen.	
Hand - en armpennen:	Groen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is diepgroen. Binnenvlag is zwartgrijs.	Gelijk aan de man.
Binnenzijde hand- en armpennen:	Geelgroen.	
Vleugel dekveren:	Groen, iets bewaasd.	Gelijk aan de man.
Middelste staartpennen:	Heldergroen overgaand in blauw.	Gelijk aan de man.
Overige staartpennen:	Groen.	Gelijk aan de man.
Onderstaartdek-veren:	Groen.	
Onderzijde staart:	Geelgroen.	
Bovenstaartdekveren:	Heldergroen.	Gelijk aan de man.
Snavel:	Rood met gele punt, ondersnavel oranje-rood.	Iets lichter dan bij man.
Snavelrand:	Bleek.	Gelijk aan de man.

Soort	Man: Java-baardparkiet	Pop: Java-baardparkiet
Neusdop:	Hoornkleurig.	
Poten:	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Ogen:	Zwart met smalle bleke iris.	Zwart met bleke iris.
Tekening:		
Keel:	Zwart, aan de onderzijde een lichte lila rand.	Zwart.
Voorhoofdsband:	Zwart.	Zwart, iets smaller dan bij de man.
Oogring:	Iets groen.	Iets groen.
Kop/nek:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Nekband (pop):	Niet van toepassing.	Rozerood.
Borst/buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Vleugelbalk:	Geelgroen.	Geelgroen.
Vleugelpennen:	Iets gezoomd.	Iets gezoomd.
Vleugelrand:	Bleekgeel.	Bleekgeel.

Keurtechnische aanwijzingen bij de Java-baardparkiet

Java-baardparkiet:

Er wordt vooral gelet op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels worden bestraft. Ook een goede conditie is een eerste vereiste. Het missen van een of meer nagels is een veel voorkomende fout. De snavel is gaaf. Bij kleur rekening houden met het feit dat de kleuren van de edelparkieten niet die helderheid en intensiteit hebben van de andere kromsnavels. Wel er streng op letten dat de lichaamskleur geen zwarte omzoming toont. De kleurscheiding tussen borst en buik is zo strak mogelijk. De diepst gekleurde borstkleur geniet de voorkeur. De nagels zijn eenkleurig. De keel/baard tekening loopt strak vanaf de ondersnavel tot in de nek en met een boog onderlangs de hals. De voorhoofdsband is enkele millimeters en loopt van oog tot oog. De vleugelbalk is zo strak mogelijk aan de onderzijde. Dit iets soepeler beoordelen. De pop is over het algemeen doffer van kleur en tekening en is vooral te herkennen aan de rozerode nekband. Dit geldt ook bij alle ondersoorten.

Beide geslachten bezitten een rode snavel.

Hier is ook het grootste verschil met de rozeborst-baardparkiet waarbij de pop een zwarte snavel bezit en de man een zwarte ondersnavel heeft. De kopkleur van de Java-baardparkiet man is helder grijs met een blauwe waas en bij de rozeborst-baardparkiet helder blauwgrijs met een lila waas.

Jonge vogels hebben een groene kop met een grijze aanslag, een groenachtige borst en een kortere staart. Op tweejarige leeftijd krijgen ze het volwassen verenkleed.

Dammerman-baardparkiet:

Deze ondersoort lijkt veel op de Java-baardparkiet, maar is duidelijk groter en heeft een veel forsere snavel. De kleur van de snavel is echter gelijk. De kruin is wat blauwer van tint en de lichaamskleur helderder groen. Ook de schoudervlek en nek zijn helderder, meer geel.

Zie ook keurtechnische aanwijzingen bij Java-baardparkiet.

Rozeborst-baardparkiet [*Psittacula fasciata*] (Statius Muller 1776)

Algemeen

Van de rozeborstbaardparkiet zijn er vijf ondersoorten, die qua formaat en kleur van de snavel verschillend zijn.

Psittacula fasciata fasciata – rozeborst-baardparkiet;

Psittacula fasciata perionca – Nias-baardparkiet;

Psittacula fasciata major – Babi-baardparkiet;

Psittacula fasciata cala – Simeulue-baardparkiet;

Psittacula fasciata abbotti – Andamanen-baardparkiet.

Hiervan worden er vier omschreven in deze standaard. De fysieke standaard geldt ook voor alle ondersoorten.

Rozeborst-baardparkiet [*Psittacula fasciata fasciata*] (Statius Muller 1776)

Deze ondersoort is zowel in de natuur als bij de kwekers de meest voorkomende soort. Er zijn dan ook al mutaties ontstaan.

Het verspreidingsgebied is Noord-India, Nepal tot Assam, Oost-Pakistan, Bangladesh, Birma, Vietnam, Thailand, Indochina en Zuid-China tot aan de provincies Yunnan en Kwangsi, het eiland Hainan en de Mergui-archipel.

Formaat: 33 cm.

Nias-baardparkiet [*Psittacula fasciata perionca*] (Oberholser 1912)

Deze ondersoort komt voor op het eiland Nias.

Formaat: 37 cm.

Simeulue-baardparkiet [*Psittacula fasciata cala*] (Oberholser, 1912)

Deze ondersoort komt voor op het eiland Simeulue in Indonesië.

Formaat: 36 cm.

Niet beschreven rozeborst-baardparkieten:

Babi-baardparkiet [*Psittacula fasciata major*] (Richmond 1902)

Zoals de toevoeging *major* al aangeeft is, binnen de groep rozeborst-baardparkieten, de Babi-baardparkiet met zijn 38 cm de grootste ondersoort. Hij lijkt veel op de rozeborst-baardparkiet, maar verschilt vooral in formaat. Ook mist de Babi-baardparkiet de blauwe en groene was in de kop. De borstkleur is ook wat dieper en mist de lila was. De Babi-baardparkiet komt voor op de Babi- en Lasa-eilanden in Indonesië.

Andamanen-baardparkiet [*Psittacula fasciata abotti*] (Oberholser 1919)

De Andamanen-baardparkiet komt ook veel overeen met de rozeborst-baardparkiet. Hij is alleen (36 cm) wat groter en over het algemeen wat lichter van kleur.

De kop toont wel de blauwe was, maar heeft geen groene was. Deze ondersoort komt alleen voor op de Andamanen-eilanden.

De fysieke standaard van de rozeborst-baardparkiet

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie komt nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking. De vogel heeft een gezonde en levendige uitdrukking zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte van de rozeborstbaardparkiet is tussen 33 cm en 38 cm. In vergelijking met de overige edelparkieten hebben de rozeborstbaardparkieten een relatief korte staart.

Model:

Een ideale rozeborstbaardparkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een rechte lijn.

De schouders zijn breed. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht.

Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken.

Houding:

De rozeborstbaardparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok omklemmen, die de vogel vrij van de stok houdt.

De dijen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De kop is vrij fors en past bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een iets afgeplatte schedel. De snavelbasis is breed. De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

Het loopbeen is recht en stevig, zonder vergroeiingen of verruwing.

Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen zijn voorzien van eenkleurige, gelijkmatig gebogen nagels.

Snavel:

De snavel is krachtig en breed aanzet. De snavel oogt robuust, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele millimeters over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is relatief kort, gesloten en aan het eind iets afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door onderstaart dekveren.

Rozeborst-baardparkiet wildkleur en mutaties, Dammerman-baardparkiet, Nias-baardparkiet en Simeulue-baardparkiet

Soort	Man: Rozeborst-baardparkiet	Pop: Rozeborst-baardparkiet	Man: Dammerman-baardparkiet	Pop: Dammerman-baardparkiet	Man: Nias-baardparkiet	Pop: Nias-baardparkiet
Formaat:	33 cm	33 cm	36 cm	36 cm	37 cm	37 cm
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)	(Wildvorm)	(Wildvorm)	(Wildvorm)	(Wildvorm)
Kop:	Helder blauwgrijs, met lila waas. Voorhoofd groen bewaasd.	Gelijk aan de man maar iets doffer.	Helder blauwgrijs, voorhoofd iets groene waas.	Helder blauwgrijs met vage blauwe waas.	Lila op een grijze ondergrond. Voorhoofd groene waas.	Gelijk aan de man maar iets vager.
Nek:	Groen.		Lichtgroen.	Lichtgroen.	Heldergroen.	
Hals en borst:	Diep roze met lila waas.	Diep roze zonder lila waas.	Diep rozerood.	Gelijk aan de man maar iets doffer.	Rozerood met lila waas.	Gelijk aan de man maar iets doffer.
Buik:	Groen.	Groen.	Lichtgroen.		Lichtgroen.	
Mantel en onderrug:	Diepgroen, iets bewaasd.	Gelijk aan de man.	Heldergroen, iets bewaasd.	Gelijk aan de man.	Heldergroen met iets grijze waas.	Gelijk aan de man.
Stuit:	Groen.		Helder lichtgroen.		Helder lichtgroen.	
Hand - en armpennen:	Diepgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is diepgroen. Binnenvlag is zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Lichtgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is groen. Binnenvlag is zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Lichtgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is groen. Binnenvlag is zwartgrijs.	Gelijk aan de man.
Binnenzijde hand- en armpennen:	Geelgroen.		Geelgroen.		Geelgroen.	
Vleugel dekveren:	Diepgroen, iets bewaasd.	Gelijk aan de man.	Heldergroen.	Gelijk aan de man.	Heldergroen, iets bewaasd.	Gelijk aan de man.
Middelste staartpennen:	Groen overgaand in blauw.	Gelijk aan de man.	Helder lichtgroen overgaand in iets blauw .	Gelijk aan de man.	Heldergroen overgaand in blauw aan de toppen.	Gelijk aan de man.
Overige staartpennen:	Groen.	Gelijk aan de man.	Lichtgroen.	Gelijk aan de man.	Heldergroen.	Gelijk aan de man.
Onderstaartdek-veren:	Groen.	Gelijk aan de man.	Lichtgroen.		Heldergroen.	
Onderzijde staart:	Geelgroen.	Geelgroen.	Geelgroen.		Geelgroen.	
Bovenstaartdekveren:	Groen.	Groen.	Helder lichtgroen.	Gelijk aan de man.	Heldergroen.	Gelijk aan de man.
Snavel:	Rood met gele punt, ondersnavel zwart.	Rood met gele punt, ondersnavel zwart.	Dieporanjerood, snavelpunt geel. Ondersnavel oranjerood.	Oranjerood, snavelpunt iets lichter. Ondersnavel ets lichter.	Oranjerood, snavelpunt geel. Ondersnavel zwart.	Zwart.
Snavelrand:	Bleek.	Bleek.	Bleek.	Gelijk aan de man.	Bleek .	Gelijk aan de man.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.		Hoornkleurig.	
Poten:	Donker vleeskleurig.	Donker vleeskleurig.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Donker vleeskleurig.	Donker vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Ogen:	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris
Soort	Man: Rozeborst-baardparkiet	Pop: Rozeborst-baardparkiet	Man: Dammerman-baardparkiet	Pop: Dammerman-baardparkiet	Man: Nias-baardparkiet	Pop: Nias-baardparkiet

Tekening:						
Keel:	Zwart. Onderzijde lila roze rand.	Zwart. Onderzijde lila roze rand.	Zwart, aan de onderzijde een lichte lila rand.	Zwart.	Zwart, aan de onderzijde een lila rand.	Zwart.
Voorhoofdsband:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart, iets smaller dan bij de man.	Zwart.	Zwart, iets smaller dan bij de man.
Oogring:	Groen.	Groen.	Iets lichtgroen.	Iets lichtgroen.	Iets groen.	Iets groen.
Kop/nek:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Nekband (pop):	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Bleekroze.	Niet van toepassing.	Lilaroze.
Borst/buik:	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Vleugelbalk:	Geelgroen.	Geelgroen.	Geel met groene waas, aan de onderzijde gezoomd.	Gelijk aan de man maar iets doffer.	Geelgroen.	Gelijk aan de man maar iets doffer.
Vleugelpennen:	. Licht gezoomd.	Licht gezoomd.	Iets gezoomd.	Iets gezoomd.	Iets gezoomd.	Iets gezoomd.
Vleugelrand:	Bleekgeel	Bleekgeel.	Bleekgeel.	Bleekgeel.	Bleekgeel.	Bleekgeel.

Soort	Man: Simeulue-baardparkiet	Pop: Simeulue-baardparkiet	Man: Rozeborst-baardparkiet	Pop: Rozeborst-baardparkiet	Man: Rozeborst-baardparkiet	Pop: Rozeborst-baardparkiet
Formaat:	36 cm	36 cm	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm
Kleur/mutatie:	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	D green - D groen	D green - D groen
Kop:	Blauwgrijs.	Blauwgrijs iets donker dan bij de man.	Helder blauwgrijs, met lila waas. Voorhoofd groen bewaasd.	Gelijk aan de man maar iets donker.	Helder blauwgrijs, met lila waas. Voorhoofd iets groene waas.	Gelijk aan de man maar iets donker.
Nek:	Diepgroen.		Groen.		Donkergroen.	
Hals en borst:	Lilaze.	Gelijk aan de man maar iets donker.	Diep roze met lila waas.	Diep roze zonder lila waas.	Diep roze met lila waas.	Diep roze zonder lila waas.
Buik:	Zeegroen, dijen groen.		Groen.	Groen.	Donkergroen.	Donkergroen.
Mantel onderrug:	Grijsgroen.	Gelijk aan de man.	Diepgroen, iets bewaasd.	Gelijk aan de man.	Diep donkergroen, iets Bewaasd.	Gelijk aan de man.
Stuit:	Diepgroen.		Groen.		Donkergroen.	
Hand- en armpennen:	Diepgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag donkergroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Diepgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag diepgroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Diep donkergroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag diep donkergroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.
Binnenzijde hand- en armpennen:	Geelgroen.		Geelgroen.		Geelgroen.	
Vleugel dekveren:	Grijsgroen.	Gelijk aan de man.	Diepgroen, iets bewaasd.	Gelijk aan de man.	Diep donkergroen, iets Bewaasd.	Gelijk aan de man.
Middelste staartpennen:	Diepgroen overgaand in blauw.	Gelijk aan de man.	Groen overgaand in blauw.	Gelijk aan de man.	Donkergroen overgaand in kobaltblauw.	Gelijk aan de man.
Overige staartpennen en onderstaart dekveren:	Diepgroen.	Gelijk aan de man.	Groen.	Gelijk aan de man.	Donkergroen.	Gelijk aan de man.

Soort	Man: Simeulue-baardparkiet	Pop: Simeulue-baardparkiet	Man: Rozeborst-baardparkiet	Pop: Rozeborst-baardparkiet	Man: Rozeborst-baardparkiet	Pop: Rozeborst-baardparkiet
Kleur/mutatie:	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	(wildvorm)	D green - D groen	D green - D groen
Onderzijde staart:	Geelgroen.		Geelgroen.		Geelgroen.	
Bovenstaart dekveren:	Diepgroen.	Gelijk aan de man.	Groen.	Gelijk aan de man.	Donkergroen.	Gelijk aan de man.
Snavel:	Oranjerood met gele punt, ondersnavel zwart.	Zwart.	Rood met gele punt, ondersnavel zwart.	Zwart.	Rood met gele punt, ondersnavel zwart.	Zwart.
Snavelrand:	Bleek.	Gelijk aan de man.	Bleek.	Gelijk aan de man.	Bleek.	Gelijk aan de man.
Neusdop:	Hoorndkleurig.		Hoorndkleurig.		Hoorndkleurig.	
Poten:	Grijs.	Grijs.	Donker vleeskleurig.	Donker vleeskleurig.	Donker vleeskleurig.	Donker vleeskleurig.
Nagels:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.
Tekening:						
Keel:	Zwart, onderzijde lila rand.	Zwart.	Zwart, onderzijde lila roze Rand.	Zwart.	Zwart met lila rand.	Zwart.
Voorhoofdsband:	Zwart.	Zwart, iets smaller dan bij de man.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Oogring:	Vaaggroen.	Vaaggroen.	Groen.	Groen.	Donkergroen.	Donkergroen.
Kop/nek en borst/buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Nekband (pop):	Niet van toepassing.	Lilaroze.	Niet van toepassing.	Dieproze.	Niet van toepassing.	Dieproze.
Vleugelbalk:	Groengeel.	Groengeel, iets vager dan bij de man.	Geelgroen.	Geelgroen, iets vager dan bij de man.	Geelgroen.	Geelgroen, iets vager dan bij de man.
Vleugelpennen:	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.
Vleugelrand:	Bleekgeel.	Bleekgeel.	Bleekgeel.	Bleekgeel.	Bleekgeel.	Bleekgeel.

Rozeborst-baardparkiet	Man:	Pop:	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Mutatie:	Greygreen - Grijsgroen	Grey green - Grijsgroen	Turquoise	Turquoise	Blue - Blauw	Blue - Blauw
Kop:	Grijs met lila waas.	Grijs.	Licht paars met roze waas. Bij voorhoofd meer blauw.	Grijs met roze waas. Bij voorhoofd meer blauw.	Licht lila. Bij voorhoofd meer blauw.	Gelijk aan de man maar iets vager.
Nek:	Grijsgroen.	Grijsgroen.	Zeegroen.	Zeegroen.	Blauw.	Blauw.
Hals en borst:	Roze/lila met grijze waas.	Roze met grijze waas.	Lichtpaars met roze waas.	Lila met roze waas.	Lichtlila.	Gelijk aan de man maar iets vager.
Buik:	Grijsgroen.	Grijsgroen.	Zeegroen.	Zeegroen.	Blauw.	Blauw.
Mantel – onderrug:	Grijsgroen met lichte waas.	Gelijk aan de man.	Diep zeegroen met lichte waas.	Gelijk aan de man.	Diep blauw met lichte waas.	Gelijk aan de man.
Stuit:	Grijsgroen.	Grijsgroen	Zeegroen.	Zeegroen	Blauw.	Blauw
Hand- en armpennen:	Grijsgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag grijsgroen. Binnenvlag zwartgrijs .	Gelijk aan de man.	Zeegroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag diep zeegroen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.	Diep blauw overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag diepblauw. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.
Binnenzijde hand- en armpennen:	Geelgrijs		Bleek geelgroen.		Wit met blauwe waas.	
Vleugel dekveren:	Grijsgroen.	Gelijk aan de man.	Diep zeegroen met lichte waas.	Gelijk aan de man.	Diep blauw met lichte waas.	Gelijk aan man.
Middelste staartpennen:	Grijsgroen overgaand in grijze toppen.	Gelijk aan de man.	Zeegroen overgaand in blauwe toppen.	Gelijk aan de man.	Blauw overgaand in diepblauwe toppen.	Gelijk aan de man.
Overige staartpennen en onderstaart dekveren:	Grijsgroen.	Gelijk aan de man.	Zeegroen.	Gelijk aan de man.	Blauw. .	Gelijk aan de man.
Onderzijde staart:	Geelgrijs.		Bleek geelgroen.		Wit met blauwe waas.	
Bovenstaart dekveren:	Grijsgroen.	Gelijk aan de man.	Zeegroen.	Gelijk aan de man.	Blauw.	Gelijk aan de man.

Rozeborst-baardparkiet	Man:	Pop:	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Mutatie:	Greygreen - Grijsgroen	Greygreen - Grijsgroen	Turquoise	Turquoise	Blue- Blauw	Blue - Blauw
Snavel:	Rood met gele punt. Ondersnavel zwart.	Zwart.	Rood met gele punt. Ondersnavel zwart.	Zwart.	Rood met bleke punt. Ondersnavel zwart.	Zwart.
Snavelrand:	Bleek.	Gelijk aan de man.	Bleek.	Bleek.	Bleek.	Bleek.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.
Tekening:						
Keel/baard:	Zwart. Onderzijde een lilagrijs rand.	Zwart.	Zwart. Onderzijde een lila rand.	Zwart.	Zwart. Onderzijde een lila rand.	Zwart
Voorhoofdsband:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Oogring:	Vaag grijsgroen.	Vaag grijsgroen.	Licht Zeegroen.	Licht Zeegroen.	Blauw.	Vaag blauw.
Kop/nek en borst/buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Nekband (pop):	Niet van toepassing.	Roze met grijze waas.	Niet van toepassing.	Bleekroze.	Niet van toepassing.	Wit.
Vleugelbalk:	Geel grijsgroen.	Geelgrijsgroen iets vager dan bij de man.	Bleek Geelgroen.	Bleek geelgroen, vager dan bij de man.	Lichtgrijs.	Dofgrijs.
Vleugelpennen:	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.	Licht gezoomd.
Vleugelrand:	Bleekgeel.	Bleekgeel.	Wit met vage gele waas.	Wit met vage gele waas.	Wit.	Vage witte pareltekening.

Keurtechnische aanwijzingen bij de rozeborst-baardparkiet

Rozeborst-baardparkiet:

Er wordt vooral gelet op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels worden bestraft. Ook een goede conditie is een eerste vereiste. Het missen van een of meer nagels is een veel voorkomende fout. De snavel is gaaf. Bij kleur rekening houden met het feit dat de kleuren van de edelparkieten niet die helderheid en intensiteit hebben van de andere kromsnnavels. Wel er streng op letten dat de lichaamskleur geen zwarte omzoming toont. De kleurscheiding tussen borst en buik is zo strak mogelijk. De diepst gekleurde borstkleur geniet de voorkeur. De nagels zijn eenkleurig. De keel/baard tekening loopt strak vanaf de ondersnavel tot in de nek en met een boog onderlangs de hals. De voorhoofdsband is enkele millimeters en loopt van oog tot oog. De vleugelbalk is zo strak mogelijk aan de onderzijde. Dit iets soepeler beoordelen. De pop is over het algemeen doffer van kleur en tekening en is vooral te herkennen aan de snavel die geheel zwart is. Ook is de zwarte voorhoofdband smaller en is de hals- en borstbevedering variabel zalmkleurig. Dit geldt ook bij alle ondersoorten. Het grootste verschil in met de Java-baardparkiet is dat bij de rozeborst-baardparkiet de pop een zwarte snavel bezit en de man een zwarte ondersnavel heeft. Ook is de kopkleur van de Java-baardparkiet meer grijs en minder blauw bewaasd. Jonge vogels hebben een groene kop met een grijze aanslag, een groenachtige borst en een kortere staart. Op tweejarige leeftijd krijgen ze het volwassen verenkleed.

Nias-baardparkiet:

Volwassen vogels lijken op de rozeborst-baardparkiet, maar is groter van formaat. Ook de gehele lichaamskleur is helderder dan bij de rozeborst-baardparkiet. De grijze kop mist blauwe en groene aanslag en de borst mist de lila waas. Verder, inclusief de snavel, gelijk aan de rozeborst-baardparkiet.

Babi-baardparkiet:

Is met zijn lengte van 38 cm de grootste en stevigste ondersoort. Verschilt van de rozeborst-baardparkiet in de borstkleur die wat intensiever is. Er kan wat kleurvariatie voorkomen.

Simuelue-baardparkiet:

Deze ondersoort lijkt veel op de rozeborst-baardparkiet, maar is iets groter. De buikkleur is groen met een opvallende lichtblauwe waas. Bij de rozeborst-baardparkiet is deze groen. De snavelkleur is gelijk aan de kleur van de rozeborst-baardparkiet. Zie ook keurtechnische aanwijzingen bij de rozeborst-baardparkiet.

Wanneer bij het keuren het formaat duidelijk afwijkt, dan wordt geadviseerd om de andere ondersoorten te bekijken en te keuren in vergelijking met de ondersoort waar de parkiet het dichtst bij hoort.

Keurtechnische aanwijzingen bij de mutaties van de rozeborst-baardparkiet

Tot nu toe zijn er alleen bij de rozeborst-baardparkiet mutaties opgetreden. Uiteraard kan dit ook bij de andere ondersoorten gebeuren. Er wel op letten dat de onderlinge verschillen zoals bij de wildvorm ook waarneembaar zijn. Let ook op het formaat.

Niet alle ontstaande mutaties zijn opgenomen in deze standaard omdat er nog niet genoeg gekend is of juiste gegevens ontbreken. Indien men niet omschreven mutaties of mutatiecombinaties tegenkomt, bij de kweker, op de vogelbeurs of tijdens een tentoonstelling, dan vragen we dit te melden bij hun keurmeestervereniging sectie grote parkieten en/of de werkgroep edelparkieten.

D green - D groen:

Bij deze nog zeldzame mutatie zijn alle groene veervelden donkergroen geworden. Ook het blauw in de staart is nu kobaltblauw geworden. De snavelkleur en borstkleur blijven gelijk. Ook de vleugelbalk is gelijk van kleur als bij de wildvorm, alleen geeft dit nu een groter contrast met het donkergroene rug/vleugeldek. D groen is een vogel met één donkerfactor. Uit de paring D groen x D groen is de kans dat 25% van de vogels DD groen zijn. Ze bezitten een dubbele donkerfactor. Deze vogels werden in het verleden olijfgroen genoemd.

De donkerfactor vererft autosomaal incomplete dominant.

Verder gelijk aan de wildvorm.

Greygreen - grijsgroen:

Ook deze mutatie is nog erg zeldzaam. Grijsgroen wordt door sommige kwekers foutief als olijfgroen genoemd.

Hoewel de kleur wel iets olijfachtig is, is olijfgroen de vroegere naam voor een groene vogel met een dubbele donkerfactor.

Het grootste verschil zit hem in het blauw bezit. Blauw wordt in combinatie met een dubbele donkerfactor mauve en bij grijsgroen wordt het blauw grijs van kleur.

Bij de meeste parkietensoorten met een blauwe staart wordt de staart bij grijsgroen zwart/grijs van kleur. Bij de rozeborst-baardparkiet zien we dit ook, evenals een grijze waas over de grijsgroene lichaamskleur.

De lila waas in de kop komt door het rood psittacine in de kop. Zowel het rood als het geel psittacine wordt niet aangetast door de grijsfactor. De vleugelpennen laten ook geen blauw, maar grijs zien. Dat de borst roze/lila is komt door de vermenging van rood met grijs. We streven naar een zo diep mogelijke grijsgroene kleur. Uiteraard geldt dat hier voorlopig nog met enige soepelheid wordt omgegaan. In combinatie met blauw wordt de kleur grijs.

De grijsfactor vererft autosomaal dominant.

Zie verder ook de wildvorm.

Turquoise:

Bij de turquoise mutatie is er een variabele reductie van het psittacine in het verenkleed. Hierdoor wordt de lichaamskleur zeegroen van kleur. Door de gedeeltelijke reductie van het rood psittacine en de blauwstructuur zien we nog een lila/roze borstkleur. De bovensnavel van de man blijft gewoon dieprood. Ook de zwarte veervelden worden niet aan getast.

Er wordt speciaal gelet op de kleur die egaal is en niet vlekkelig.

Turquoise vererft autosomaal recessief en is een allele van het *bl*-locus. Het is co-dominant met blauw.

Zie ook de wildvorm.

Blue - blauw:

Door het volledig ontbreken van het psittacine in de bevedering kleuren de vervelden die normaal groen zijn, blauw. De rode, oranjerode en gele veervelden worden wit.

De lichtgroene veervelden worden hemelsblauw, de groene worden blauw en de donkergroene kobaltblauw. De borstkleur is licht lila door de nog aanwezige

blauwstructuur en zwart eumelanine. De vleugelbocht toont een witte bocht. De tekeningvelden zijn strak afgelijnd. De lichaamskleur is ook zo egaal mogelijk en mag niet vlekkerig overkomen. Vaak zien we, vooral op het rug- en vleugeldekk, wat zwarte omzoming. Dit is een kleurfout. Blauw vererft autosomaal recessief. Zie ook de wildvorm.

Nicobarenparkiet [*Psittacula caniceps*] (Blyth 1846)

De Nicobarenparkiet komt voor op Groot en Klein Nicobar, Montshall en Kondul, eilanden ten noordwesten van Sumatra.

Formaat: 56 cm.

Deze parkiet komt niet voor in Europa en wordt niet verder besproken in de standaard.

Malakkaparkiet – langstaartparkiet [*Psittacula longicauda*] (Boddaert 1783)

Algemeen

Malakkaparkiet [*Psittacula longicauda longicauda*] (Boddaert 1783)

De Malakkaparkiet is de moeilijkste in avicultuur te houden *Psittacula* soort. Naast de nominaatvorm is er nog een ondersoort gekend, namelijk *Psittacula longicauda defontainei* – Natuna-langstaartparkiet. Deze ondersoort is nog niet in deze standaard opgenomen omdat ze niet in Europa voorkomt. We zullen echter een korte beschrijving geven.

Er is dimorfisme tussen man en pop. De pop heeft een zwarte snavel, een groene nekkleur, minder rood aan kop, een donkergroene baardtekening en de staart is veel korter.

Verspreidingsgebied: Borneo, Sumatra, Maleisië, Singapore en Malakka.

Formaat: man 42 cm; pop 37 cm.

Natuna-langstaartparkiet [*Psittacula longicauda defontainei*] (Chasen 1934)

Verspreidingsgebied: de kleine eilanden Natuna, Riau, Bintan, Belitung en Karimata.

Lijkt erg veel op de nominaatvorm. Ook het formaat is hetzelfde (42 cm). De weinige verschillen zijn de wangen die iets dieper van kleur zijn met een oranje-rode waas en de kop die iets geler is.

De pop heeft een iets dieper rode wangkleur dan de nominaatvorm.

De Natuna-langstaartparkiet komt niet voor in Europa.

Fysieke standaard van de Malakkaparkiet

Gelijk aan de standaard van de rozeborst-baardparkiet. Alleen de kop en snavel zijn wat kleiner /smaller. Ook steekt de bovensnavel wat meer naar voren. De punt hiervan blijft ongeveer één cm van de keel verwijderd. Het model lijkt wat smaller/ieler. Dit komt door de lange staart van de man. De bovenschedel is ook iets meer afgeplat.

Malakkaparkiet

Soort	Man: Malakkaparkiet	Pop: Malakkaparkiet
Kleur:	(wildvorm)	(wildvorm)
Formaat:	42 cm	37 cm
Kop:	Dieproze, bovenschedel donkergroen.	Heldergroen, iets blauwe waas op achterwangen.
Nek:	Licht geelgroen.	Groen.
Hals en borst:	Lichtgroen.	Diep heldergroen.
Buik en onderlijf:	Lichtgroen met gele waas.	Lichtgroen.
Mantel/rugdek:	Licht geelgroen met iets blauwe waas.	Groen, iets bewaasd.
Stuit:	Egaal lichtgroen.	Lichtgroen.
Hand- en armpennen:	Groen met zwartgrijze toppen. Buitenvlag groen. Binnenvlag zwartgrijs.	Gelijk aan de man.
Vleugel dekveren:	Diepgroen, met geelgroene waas.	Gelijk aan man, iets meer bruine waas.
Middelste staartpennen:	Violet.	Gelijk aan de man.
Overige staartpennen:	Diepblauw met groene buitenvlag.	Gelijk aan de man.
Onderstaart dekveren:	Geelgroen.	
Bovenstaart dekveren:	Lichtgroen.	Lichtgroen.
Snavel:	Rood, iets lichte punt. Ondersnavel zwart.	Zwart.
Snavelrand-Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart met bleke iris.	Zwart met bleke iris.

Soort:	Man: Malakkaparkiet	Pop: Malakkaparkiet
Tekening:		
Keel/baard:	Zwart.	Donkergroen.
Oogstreep/masker:	Niet van toepassing.	Dieproze.
Voorhoofdsband:	Blauwzwart.	Blauwzwart.
Halsband (pop):	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Kop/nek:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Schoudervlek:	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Vleugelpennen:	Licht geelgroen gezoomd.	Gelijk aan de man.

Keurtechnische aanwijzingen bij Malakkaparkiet

De Malakkaparkiet komt het best tot zijn recht als hij in een ruime tentoonstellingskooi geplaatst wordt. Beter is in een vlucht. Dit om de staart niet te beschadigen. Als hij in een tentoonstellingskooi zit waarbij de punt van de staart de bodem of de zijkant raakt, dan opmerken dat vogel beter tot zijn recht komt in een grotere kooi. Indien de staart niet beschadigd is, niet straffen.

Een goede conditie is een eerste vereiste. De kleur is helder en egaal en geeft geen vlekkerige indruk.

De baard is vrij smal en loopt door tot halfweg de kop. Bij de man is deze zwart en bij de pop donkergroen. Zowel de baard als de schedel zijn strak afgelijnd. De pop heeft alleen een rood masker tussen de baard en halfweg het oog en een rood vlekje achter het oog. Verder is de kop heldergroen, op de donkergroene voorhoofdsband na.

Jonge vogels zijn donkerder groen en lijken veel op de pop. Het masker is wel lichter van kleur. De snavel is bij jongen zwart en jonge mannen tonen al een blauwe waas op het rugdek.

Er zijn al mutaties ontstaan, maar er zijn nog te weinig gegevens over gekend om ze nu al in deze standaard op te nemen. Wat al is ontstaan zijn de mutaties D green – D groen en aqua of turquoise.

Verder gelijk aan overige edelparkieten.

Nicobaren-langstaartparkiet [*Psittacula nicobarica*] (Gould 1857)

Nicobaren-langstaartparkiet [*Psittacula nicobarica nicobarica*] (Gould 1857)

Verspreidingsgebied: de Nicobaren-eilandengroep.

De Nicobaren-langstaartparkiet is 48 cm groot, waarbij de staart van de man de helft van de totale lengte voor zijn rekening neemt. De kop heeft diep rode wangen en een groengele achterkop en nek. De kop toont een blauwe waas. De onderrug is groenachtig van kleur.

De pop verschilt van de nominaatvorm door de zalmkleurige wangen.

Andamanen-langstaartparkiet [*Psittacula nicobarica tytleri*] (Hume 1874)

Deze ondersoort komt voor op de Andamanen- eilanden. De Andamen langstaartparkiet verschilt van de nominaatvorm voornamelijk in grootte (44 cm) en kleur rond de kop. Het achterhoofd, de wangen en het rugdek zijn geelgroen met een grijze waas. De keel, borst en buik hebben een blauwe waas.

De pop heeft een dof oranje- of roodachtige wangtekening.

Engganoparkiet [*Psittacula modesta*] (Fraser 1845)

De Engganoparkiet wordt in de recente literatuur als een zelfstandige soort beschouwd.

Deze soort komt niet in Europa voor.

Verspreidingsgebied: het eiland Enggano in Indonesië.

Deze soort verschilt van de langstaartparkiet voornamelijk in formaat. De man is 48 cm groot, maar zijn staart is veel korter. Vooral het lichaam zelf is veel forser.

De gehele kop is diep rood van kleur inclusief de schedel met op het voorhoofd een groene waas en een duidelijke teugelstreep. De wangen zijn diep rood en de achterkop is roodbruin met groene waas.

De pop van deze ondersoort verschilt voornamelijk in formaat (43 cm) en kopkleur. De achterkant van de kop heeft een roodbruine kleur met groene waas.

Inhoudsopgave

Het geslacht <i>Psittacula</i> , edelparkieten	3
Standaard Edelparkieten.....	7
Grote Alexanderparkiet [<i>Psittacula eupatria</i>] (Linnaeus 1766)	7
Algemeen	7
Fysieke standaard van de grote Alexanderparkiet	8
Grote Alexanderparkiet, Nepal-Alexanderparkiet en Laos-Alexanderparkiet.....	9
Grote Alexanderparkiet mutaties	11
Keurtechnische aanwijzingen bij de grote Alexanderparkiet, Nepal-Alexanderparkiet en Laos-Alexanderparkiet.....	13
Keurtechnische aanwijzingen bij de mutaties van de grote Alexanderparkiet.....	14
Afrikaanse halsbandparkiet [<i>Psittacula krameri krameri</i>] (Scopoli 1769).....	16
Algemeen	16
De fysieke standaard van de Afrikaanse halsbandparkiet.....	16
Keurtechnische aanwijzingen bij de Afrikaanse halsbandparkiet	19
Pruimenkopparkiet - Rozekopparkiet - Grijskopedelparkiet – Finsch-edelparkiet	20
Algemeen	20
Fysieke standaard van de pruimenkopparkiet, rozekopparkiet, grijskopedelparkiet en Finsch-edelparkiet.....	22
Rozekopparkiet, grijskopedelparkiet en Finsch-edelparkiet.....	22
Pruimenkopparkiet mutaties	24
Keurtechnische aanwijzingen bij de pruimenkopparkiet, rozekopparkiet, grijskopedelparkiet en Finsch-edelparkiet	26
Keurtechnische aanwijzingen bij de mutaties van de pruimenkopparkiet	27
Malabarparkiet en Layardparkiet	29
Algemeen	29

Malabarparkiet en Layardparkiet:	29
Keurtechnische aanwijzingen bij de Malabarparkiet en Layardparkiet.....	31
Derbyparkiet [<i>Psittacula derbiana</i>] (Fraser 1852).....	32
Algemeen	32
Fysieke standaard van de Derbyparkiet	32
Derbyparkiet	32
Keurtechnische aanwijzingen bij de Derbyparkiet.....	34
Java-baardparkiet [<i>Psittacula alexandri</i>] (Linnaeus 1758).....	35
Algemeen	35
Java-baardparkiet.....	36
Keurtechnische aanwijzingen bij de Java-baardparkiet.....	37
Rozeborst-baardparkiet [<i>Psittacula fasciata</i>] (Statius Muller 1776)	39
Algemeen	39
De fysieke standaard van de rozeborst-baardparkiet.....	40
Rozeborst-baardparkiet wildkleur en mutaties, Dammerman-baardparkiet, Nias-baardparkiet en Simeulue-baardparkiet	41
Keurtechnische aanwijzingen bij de rozeborst-baardparkiet	47
Keurtechnische aanwijzingen bij de mutaties van de rozeborst-baardparkiet	48
Nicobarenparkiet [<i>Psittacula caniceps</i>] (Blyth 1846).....	50
Malakkaparkiet – langstaartparkiet [<i>Psittacula longicauda</i>] (Boddaert 1783).....	50
Algemeen	50
Fysieke standaard van de Malakkaparkiet.....	50
Malakkaparkiet	51
Keurtechnische aanwijzingen bij Malakkaparkiet.....	52
Nicobaren-langstaartparkiet [<i>Psittacula nicobarica</i>] (Gould 1857)	53

Nicobaren-langstaartparkiet [<i>Psittacula nicobarica nicobarica</i>] (Gould 1857)	53
Andamanen-langstaartparkiet [<i>Psittacula nicobarica tytleri</i>] (Hume 1874).....	53
Engganoparkiet [<i>Psittacula modesta</i>] (Fraser 1845).....	53