



Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie



Beschrijving lori's en grote parkieten Keurtechnische aanwijzingen

INHOUDSOPGAVE

ZWARTE LORI	3
BERNSTEINLORI	4
RAJAHLORI (FLUWEELLORI)	5
DUIVENBODELORI	6
GEELSTREPENLORI	7
GROENVLEUGEL-STREPENLORI	8
KARDINAALLORI	9
KONINGSLORI	10
MOLUKKENLORI	11
VIOOLTJESLORI	12
IRISLORI	13
RODE LORI	15
SCHUBBENLORI	16
ORNAATLORI	18
GROENNEKLORI	19
ROODNEKLORI	20
LORI VAN DE BLAUWE BERGEN	22
LENTEPAPEGAAITJE	25
FILIPIJNSE HANGPAPEGAAI	26
BLAUWKROONTJE	28
PATAGONISCHE ROTSPARKIET	29
BONTE BOER (SENEGALPAPEGAAI)	31
MEYERPAPEGAAI	34
PRINSES VAN WALES PARKIET	36
SWIFTPARKIET	38
PORT LINCOLN PARKIET	41
TWENTY-EIGHT PARKIET	42
BARNARD PARKIET	44
CLONCURRY PARKIET	45
JENDAYA PARKIET	47
ZON PARKIET	48
NANDAYA PARKIET	50
ROODVOORHOOFD KAKARIKI	51
GEELVOORHOOFD KAKARIKI	52
BERG PARKIET	53
BARRABAND PARKIET	55

Zwarte lori

Chalcopsitta atra atra

Lengte:

32 cm

Kop en masker:

Zwarte kop met purperen waas. Zwarte naakte huid rond het oog en de basis van de onderbek

Vleugels:

Zwart met purperen waas

Lichaam:

Zwart met purperen waas. Violetbewaasde stuit

Staart:

Bovenkant is zwart. Onderkant is olijfgeel met rood gemarkeerd

Aan de basis

Snavel:

Zwart

Ogen:

Bruine irisring (bij sommige vogels geel)

Poten:

Grijs met donkere nagels

Jonge vogels:

De naakte huid rond de ogen en de basis van de onderbek is wit.

De irisring is donkerbruin. De bevedering is iets minder egaal van kleur.



Keurtechnische opmerkingen

- o Een goede conditie wordt vereist
- o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn
- o Donkere poten en teennagels

BERNSTEINLORI

Chalcopsitta atra bernsteini

Lengte:

34 cm

Kop en masker:

Zwart met een purperen waas. Voorhoofd en teugels hebben een wijnrode purperachtige gloed.

Zwarte naakte huid rond het oog en de basis van de onderbek.

Vleugels:

Zwart met een purperen waas.

Lichaam:

Zwart met purperen waas. Stuit donkerblauw (meer blauw dan bij Atra). Dijen met rode waas (minder bij de pop).

Staart:

Bovenkant zwart. Onderkant olijfgeel met rood gemarkeerd aan de basis.

Snavel:

Zwart.

Ogen:

Bruine iris

Poten:

Grijs met donkere nagels

Jonge vogels:

De naakte huid rond de ogen en de basis van de onderbek zijn wit. De iris is donkerbruin.

De bevedering is iets minder egaal van kleur dan bij de volwassen vogels.



Keurtechnische opmerkingen

- o Een goede conditie wordt vereist
- o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn
- o Donkere poten en teennagels

RAJAHLORI (FLUWEELLORI)***Chalcopsitta atra insignis*****Lengte:**

31 cm

Kop en masker:

Zwart met een purperen waas, gestreept met grijsachtig blauw. Voorhoofd, teugels en wangen zijn krachtig rood. Zwarte naakte huid rond het oog en de basis van de onderbek.

Vleugels:

Zwart met een purperen waas. Vleugelbocht en vleugelzoom zijn rood. Onder-vleugeldeken zijn rood.

Lichaam:

Zwart met een purperen waas. De stuit is bleekblauw. De dijen zijn rood. De borstveren zijn aan de basis rood met zwarte omzoming.

Jonge vogels:

Hebben weinig rode tekening en lijken daardoor op bernsteini.

**Keurtechnische opmerkingen**

- o Een goede conditie wordt vereist
- o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn
- o Donkere poten en teennagels

DUIVENBODELORI

Chalcopsitta duivenbodei dubois

Lengte:

31 cm

Kop en masker:

Donkerolijfbruin. Voorhoofd, teugels en voorste gedeelte van de wangen zijn geel. Zwarte naakte huid rond de ogen en aan de basis van de onderbek.

Vleugels:

Donker olijfbuin. De keel is geel, de nek en de hals zijn geel gestreept. De borstveren hebben een gele omzoming. De stuit is violetblauw. De dijen zijn geel.

Staart:

De bovenzijde is donker olijfbuin, de buitenste staartveren zijn geel bewaasd

De onderzijde is bronsachtig van kleur met een violetachtige schijn.

Snavel:

Zwart

Ogen:

Oranjerode ris

Poten:

Donkergrijs met donkere nagels

Jonge vogels:

Minder sterk afgelijnde tekening met iets fletsere kleuren. Witte naakte huid rond het oog en aan de basis van de onderbek.



Keurtechnische opmerkingen

- o Een goede conditie wordt vereist
- o Gele omzoming op borst en keel moet aanwezig zijn
- o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn
- o Donkere poten en teennagels

GEELSTREPENLORI

Chalcopsitta scintillata scintillata

Lengte:

31 cm

Kop en masker:

De kopkleur is donkerbruin. Het voorhoofd en de teugels zijn rood. De schedel, de oor-streek en de wangen zijn zwartbruin. De kop- en nekbevedering vertonen een variabele groengele soms geeloranje streeptekening.

Vleugels:

Donkergroen. Ondervleugeldeken rood. Gele band aan de onderkant van de slagpennen.

Lichaam:

Donkergroen. Borst vertoont een geeloranje gestreepte tekening, de buik heeft een goudgele streeptekening. Deze kleuren kunnen al naar gelang welke vogel variëren van groen, geel en oranje. Dijen zijn rood.

Snavel:

Zwart.

Ogen:

Iris is geel tot oranje-rood.

Poten:

Donkergrijs met donkere nagels

Jonge vogels: de gele strepen op de borst en de mantel zijn minder duidelijk en het rood aan de borstzijde is minder intensief.



Keurtechnische opmerkingen

- o Voorhoofd en teugels moeten zo zuiver mogelijk rood zijn
- o De bestreping op de borst is variabel, voorkeur aan geeloranje bestreping
- o Donkere vlekken op buik moeten bestraft worden
- o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn
- o Donkere poten en teennagels
- o Een goede conditie wordt vereist

GROENVLEUGEL-STREPENLORI

Chalcopsitta sintillata chloroptera

Verschilt slechts in één kenmerk met de geelstrepensori, nl de groene ondervleugeldekveren. Vaak hebben ze ook een fijnere, meer groengele bestreping over het lichaam, maar dit geldt niet altijd. Er zijn veel vogels die een tussenvorm zijn. Dit is te merken aan de overgang van groene naar rode ondervleugeldekveren.



Groenvleugel-strepenlori



Geelstrepensori

Keurtechnische opmerkingen

- o Een goede conditie is noodzakelijk
- o Voorhoofd moet zo zuiver mogelijk rood zijn
- o De bestreping op de borst moet groengeel zijn en mag geen oranje of rood vertonen
- o Donkere vlekken op buik moeten bestraft worden
- o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn
- o Donkere poten en teennagels

KARDINAALLORI

Chalcopsitta (Cardeos) cardinalis

Lengte:

31 cm

Kop en masker:

Rood

Lichaam:

Rood, donkerder en bruinachtiger op de rug. Bleekgele omzoming aan de veren van het onderlichaam.

Staart:

Bruinrood

Snavel:

De bovensnavel is zwart met oranje punt, de ondersnavel is oranje.

Ogen:

Oranjerode iris

Poten:

Grijs met donkere nagels

Jonge vogels:

Bleekrode kleur op de rug en vleugels. Staart is korter en meer puntig. De snavel is dof oranje met zwarte tekening. De iris is dofgeel.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Een goede conditie wordt vereist
- o De snavel mag niet beschadigd zijn, bovensnavel is zwart met oranje punt. De ondersnavel is oranje.
- o Donkere poten en teennagels

KONINGSLORI

Eos cyanogenia Bonaparte 1850

Lengte:

30 cm

Kop en masker:

Rood. Violetblauwe band van het oog tot de bovenste oorstreken.

Vleugels:

Rood. Bovenste vleugelgebieden en slagpennen zijn zwart. De buitenrand heeft een rode tekening.

Lichaam:

Rood. Zwarte vlekken op de flanken. De schouderveren en flanken/dijen zijn zwart.

Staart:

Zwarte centrale staartveren met rood omzoomde buitenste veren. De onderstaartveren zijn rood. De buitenste vlaggen zijn zwart.

Snavel:

Oranjerood

Ogen:

Oranjerode iris

Poten:

Donkergrijs met donkere nagels

Jonge vogels:

Kop, hals en onderlichaam hebben donkere zomen. Donkere snavel.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Een goede conditie wordt vereist
- o De snavel mag niet beschadigd zijn
- o De zwarte vleugelvlek moet zuiver zwart zijn
- o Donkere poten en teennagels

MOLUKKENLORI

Lorius garrulus garullus (Linnaeus 1758)

Lengte:

30 cm

Kop en masker:

Helder rood met naakte grijszwarte oogring.

Vleugels

De vleugels zijn groen met gele vleugelbochten.

Lichaam:

Rood Op de rug bevindt zich meestal een gele driehoekige vlek tussen de vleugels. Zij varieert van klein tot niet aanwezig. De broekbevedering is groen.

Staart:

De staart is groen met een breed groen uiteinde.

Snavel:

De snavel is oranjerood.

Ogen:

Geelbruine tot oranjerode iris.

Poten:

De poten zijn donker met donkere nagels.

Jonge vogels:

Meer bruine snavel en donkerbruine iris.

Ondersoorten:

Geelmantellori: *Lorius garrulus flavopalliatu* Salvadori 1877:

Lengte: 27 cm.tot 30 cm

Als nominaatvorm maar heeft een grote gele rugvlek.

Morotailori :*Lorius garrulus morotaianus* (Bemmel 1940)

Lengte: 30 cm.

Als nominaatvorm maar met grotere gele rugvlek. De grootte ligt ts L.g.garralus en L.g. flavopalliatu in.

Keurtechnische opmerkingen:

- o Een goede conditie wordt vereist
- o De snavel mag niet beschadigd zijn
- o Donkere poten en teennagels
- o Gezien de ondersoorten onderling verpaard zijn, worden vogels met of zonder rugvlek aanvaard.



VIOOLTJESLORI

***Psitteuteles goldiei* (Sharpe 1882)**

Lengte:

20 cm

Kop en masker:

Overwegend paarsrood met helder purperrode schedel. De wangen zijn roodachtig paars met blauwe streeptekening.

Vleugels:

Vleugels donkergroen.

Lichaam:

Borst en buik zijn geelgroen met brede verticale donkergroene strepen. De rug is donkergroen.

Staart:

Groen. Onderstaart is geelgroen.

Snavel:

Zwart.

Poten:

Donkergrijs

Pop:

Het purperrood van de schedel en voorhoofd en het paars van de wangen zijn minder uitgebreid en minder intensief als bij de man.

Jongen:

Zijn minder intensief gekleurd. Het rood van de kop is op het voorhoofd beperkt. Vertonen al dan niet de maskerkleur.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Een goede conditie wordt vereist
- o De snavel mag niet beschadigd zijn
- o De bestreping moet symmetrisch zijn
- o De pootkleur en teennagels moeten egaal van kleur zijn

IRISLORI

***Psitteuteles iris iris* (Temminck 1835)**

Lengte:

20 cm

Kop en masker:

Groen. Voorhoofd, het voorste deel van de schedel en de oogstreep zijn rood. Soms gaat de smalle rode oogstreep over in een roodvioletten kleur die gaat tot achter het oordek. De achterzijde van de schedel is grijsblauw, meestal met groen doorweven. Het oordek is violetblauw. In de nek verschijnt een gele band.

Vleugels:

De vleugels zijn donkerder groen.

Lichaam:

De borstkleur is geelgroen met een groene omzoming. De buikkleur is geelgroen.

Staart:

De bovenzijde van de staart is groen en de onderzijde olijfgroen.

Ogen:

Smalle naakte donkergrijze oogring. De iris is oranje.

Snavel:

Oranjerood met een gele punt.

Poten:

Blauwgrijs met donkere nagels.

Jonge vogels:

Hebben een donkere snavel en een donkere iris. Het rood en het violet zijn minder aanwezig.

ONDERSOORTEN

Roodkap-irislori: *Psitteuteles iris rubripileum*

Zoals nominaatvorm maar het voorhoofd en de schedel zijn volledig rood, zonder lichtblauwe kleur. Soms is het rood van de schedel doorweven met groene veertjes

Wettar-irislori: *Psitteuteles iris wetterensis* (Hellmayr 1912)

Zoals de nominaatvorm maar in het geheel donkerder groen en ongeveer 2 cm groter. De bevedering van de schedel is rood en variabel doorweven met grijsblauw.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Een goede conditie wordt vereist
- o Het voorhoofd moet zo zuiver mogelijk van kleur zijn
- o De oorvlek moet goed afgelijnd zijn
- o De snavel mag niet beschadigd zijn
- o Donkere poten en teennagels

RODE LORI

***Eos bornea bornea* (Linnaeus 1758)**

Lengte:

27 tot 32 cm

Kop en masker:

Helderrood

Vleugels:

Rode vleugels waarover een blauwe band van ongeveer 2 cm breed loopt. De grote slagpennen zijn zwart met rode spiegels, de kleine slagpennen zijn rood.

Lichaam:

Helder rood. De aarsbevedering is overwegend donkerblauw.

Staart:

Dofrood

Ogen:

De smalle naakte oogring is blauwgrijs.

Snavel:

Oranjerood

Poten:

Grijszwart met donkere nagels.

ONDERSOORT:

Rode Burulori: *Eos bornea cyanonotus* (Vieillot 1818)

Lengte: 28 cm.

Is kleiner dan de nominaatvorm en zijn geheel donkerder rood, alsof er een donkere waas over het verenkleed ligt.

De raszuivere komt praktisch niet meer voor.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Kop en lichaam zijn zuiver rood.
- o Vleugeldekkers zo egaal mogelijk van kleur.
- o Het blauw op de vleugels moet goed zichtbaar zijn, maar heeft soms uitlopers naar de vleugelpennen

SCHUBBENLORI

Trichoglossus chlorolepidotus chlorolepidotus

Lengte:

23 cm

Kop en masker:

Groen met blauwe aanslag op kruin.

Vleugels:

De ondervleugeldekveren en de band aan de onderzijde van de slagpennen zijn oranjegeel.

Lichaam:

De nek, hals en borst zijn voorzien van brede gele zomen. De dijen en de zijkan-ten van het lichaam zijn geel doorweven.

Staart:

De onderstaartdekveren zijn geel doorweven. De basis van de buitenste staartveren is breed gezoomd met een oranjegele binnenvlag.

Ogen:

De smalle naakte oogring is grijs, de iris oranjegeel.

Snavel:

Oranje

Poten:

Grijs met donkere nagels.

Jonge vogels:

De snavel en de iris zijn donker gekleurd.

Ondersoort:

Kleine schubbenlori: *Trichoglossus chlorolepidotus neglectus*

Zoals de nominaatvorm maar kleiner. Lengte: 21 cm.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Rode veertjes op borst, buik, onderbuik en flanken foutief.
- o Donkere poten en nagels

MUTATIES:

D groen, DD groen, grijsgroen, bont, cinnamon, lutino, dilute en blauwe mutaties

 © Piet Zuinkels		
DDgroen en Dgroen	Cinnamon schubbenlori	Dilute en cinnamon
	 Chris Irvine.	
Bonte schubbenlori	Schubbenlori wildkleur en lutino	

ORNAATLORI

Trichoglossus (Trichoglossus) ornatus (Linnaeus 1758)

Lengte:

25 cm

Kop en masker:

Het voorhoofd, de kruin en het voorste gedeelte van de oorstreek zijn paarsblauw. Het achterste gedeelte van de oorstreek is rood. De bevedering op de achterzijde van de kop is rood met donkerblauwe zomen

Vleugels:

Bovenzijde vleugels is groen. De ondervleugel dekveren zijn geel.

Lichaam:

De lichaamskleur is overwegend groen. Aan weerszijden van de hals bevindt zich een gele band. De hals en de borst zijn rood met een blauwzwarte omzoming. De rug is groen. Buik en broekbevedering zijn groen met gele streepjes.

Staart:

De onderzijde is geel.

Ogen:

Een smalle naakte zwarte oogring. De iris is rood.

Snavel:

De snavel is oranje.

Poten:

De poten zijn grijs met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen:

- o De gele band op de zijkant van de hals moet zuiver geel zijn
- o Zwarte vlekjes op het vleugeldek zijn foutief
- o Gele vlekjes op de borst zijn een fout

GROENNEKLORI

Trichoglossus (Trichoglossus) haematodus (Linnaeus 1771)

Lengte:

26-28 cm

Kop en masker:

Het voorhoofd, het voorste deel van de schedel, de wangen, de teugel en de kin zijn blauw. Deze blauwe kleur gaat op het achterste gedeelte van de schedel, de bovenzijde van de borst en de achterzijde van de wangen over in een bruinzwarte kleur.

Vleugels:

De ondervleugeldekenveren zijn rood en de onderkant van de vleugelpennen is geel met brede zwarte zomen.

Lichaam:

Overwegend groene kleur. In de nek bevindt zich een groengele band. De veren van de borst zijn rood met blauwzwarte zomen. De buik is donkergroen. De aarsbevedering is geelgroen met donkergroene zomen, net als de dijen en de onderstaartdekveren.

Staart:

De bovenzijde is groen. De onderzijde van de staart is olijfgeel.

Ogen:

De naakte smalle oogring is grijs. De iris is roodbruin.

Snavel:

Oranjerood.

Poten:

Grijs met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Heeft een vrij intensieve tekening op de keel. Deze tekening mag niet onderbroken zijn.
- o Rode veertjes in de nekband zijn een fout.

ROODNEKLORI

Trichoglossus (Trichoglossus) rubritorquis Vigors & Horsfield 1827

Lengte:

28-30 cm

Kop en masker:

De kop is helder violetachtig blauw met lichtblauwe schachttekening. De hals en de zijanten van de nek zijn zwartachtig violetblauw. De nekband is oranjerood. Achter deze nekband volgt een violetblauwe band die naar de rug toe doorspekt is met oranjerode veren.

Vleugels:

Groen. De ondervleugeldekenveren zijn rood. De onderkant van de slagpennen is geel met brede zwarte uiteinden.

Lichaam:

Groen. De borst is geeloranje tot diep oranjerood zonder zomen aan de veren. De buik is groen tot blauwachtig zwart. Op de dijen bevinden zich gele veervelden.

Staart:

De staart is aan de bovenkant groen en aan de onderzijde olijfgeel. Op de onderstaartdekveren bevinden zich gele veervelden.

Ogen:

De smalle naakte oogring is grijs, de iris roodbruin.

Snavel:

De snavel is oranjerood.

Poten:

Grijs met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Schubtekening op de borst en nek is een fout
- o Zuiver snavel vereist
- o Donkere poten en teennagels

MUTATIES:

	
	Roodneklori wildkleur en lutino
	
Roodneklori grijsgroen	

LORI VAN DE BLAUWE BERGEN

Trichoglossus moluccanus moluccanus

Lengte:

30 cm

Kop en masker:

Violetblauw gestreept.

Vleugels:

Groen. De ondervleugeldekveren zijn rood, de onderkant van de slagpennen is geel met brede zwarte uiteinden.

Lichaam:

Groene nekband. De borstkleur varieert van geel naar helder oranje-rood. De buik is violetblauw naar de flanken toe overgaand in oranje. De rugkleur is groen.

Staart:

Boven groen, de onderstaartdekveren zijn geeloranje.

Snavel:

Rood.

Ogen:

Oranjerode iris

Poten:

Grijs met donkere nagels.

ONDERSOORTEN:

Noordelijke lori van de Blauwe Bergen

(*Trichoglossus m.septentrionalis* Robinson 1900)

- ✓ Is kleiner van formaat: 25 cm
- ✓ Kop en buikvlek zijn blauw zonder violette kleur.

Zuidelijke lori van de Blauwe Bergen (*Trichoglossus m.eyrei* Mathews 1912)

- ✓ Formaat is 30 cm
- ✓ Lichter gekleurd dan nominaatvorm.
- ✓ De borst is eerder geel dan oranje-rood en het blauw op de buik is minder uitgebreid.

Keurtechnische opmerkingen

- o Borstkleur mag geen donkere omzoming vertonen. Geel aan beide zijden van de borst is geen fout, doch hoe egaler van kleur hoe beter.
- o De aflijning tussen borst en buik moet zo strak mogelijk zijn.
- o De kopkleur mag geen donkere waas vertonen.
- o Nekkleur moet zuiver zijn.



Lori van de Blauwe Bergen – **MUTATIES**

		
Bont	Fallow	Gepareld
		
DD groen	Roodbuik is een selectievorm en niet aanvaard	Roodborst is een selectievorm en niet aanvaard

		
Lutino	Blauw	Dilute groen – Dilute olijfgroen

LENTEPAPEGAAITJE

Loriculus vernalis (Sparrman 1787)

Lengte:

13 cm

Kop en masker:

Geelgroen met een blauwe keelvlak.

Vleugels:

Groen. Aan de onderzijde groenachtig blauw.

Lichaam:

Algemeen verenkleed groen, de onderrug en de bovenstaartdekveren zijn rood.

Snavel:

Donker koraalrood met een gele punt.

Ogen:

Geelachtig witte of donkerbruine iris.

Poten:

Bruinachtig met grijze nagels.

Jonge vogel:

Voorhoofd en wangen dof grijsachtig groen. Groene veertjes op de rode stuit. Snavel is lichtoranje.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Een goede conditie wordt vereist.
- o Blauwe keelvlak moet aanwezig zijn

FILIPIJNSE HANGPAPEGAAI

***Loriculus philippensis philippensis*(Statius Müller 1776)**

Lengte:

14 cm

Kop en masker:

Groen. Voorhoofd en voorkruin zijn rood. Kruin en nek hebben een goudgele waas. In de nek bevindt zich een smalle oranje-gouden band. Onder de snavel bevindt zich een grote oranje-rode halsvlek die zich tot de bovenborst uitstrekt.

Vleugels:

Groen. Onderkant is groenachtig blauw. De grote onderdekveren zijn blauw.

Lichaam:

Algemeen verenkleed is groen en naar beneden toe lichter en geelachtiger. De onderrug en de bovenstaartdekveren zijn rood. Lichtblauwe vlekken op stuitzijden.

Staart:

Bovenzijde is groen, de onderzijde is groen-blauw.

Snavel:

Oranje-rood.

Ogen:

Donkerbruine iris

Poten:

Bruinachtig roze met donkere nagels

Poppen:

Geen rood aan de keel en borst, maar wel een geelachtige waas. Het voorste gedeelte van de wangen is hemelsblauw. Het rood op de kruin is beperkt tot het voorhoofd.

Jonge vogels:

Zoals de poppen.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Goed conditie wordt vereist
- o De oranje-rode halsvlek moet zo goed mogelijk afgelijnd zijn

Ondersoorten

Mindoro-hangpapegaai: (*Loriculus p. Mindorensis* Steere 1890)

Donkerrode borstvlek (geen oranje)

Donkergroene rug zonder waas en nekband

Negros hangpapegaai (*Loriculus p. Regulus* Souancé)

Dieprode borstvlek

Gele kruin (bij nominaatvorm is voorste gedeelte van de kruin rood met goudgele waas).

Sulu-hangpapegaai (*Loriculus p. Bonapartei* Souancé 1856)

Zwarte snavel

BLAUWKROONTJE

Loriculus galgulus

Lengte:

12 cm

Kop en masker:

Groen met donkerblauwe kruin. Onder de snavel bevindt zich een rode halsvlek.

Vleugels:

Groen. Onderkant is groenachtig blauw.

Lichaam:

Algemeen verenkleed is groen, naar beneden toe iets lichter van kleur. Op de bovenzijde van de rug bevindt zich een goudgele (driehoekige) vlek. De stuit is rood.

Staart:

Bovenzijde is donkergroen. De onderzijde groenachtig blauw. De bovenstaartdekveren zijn rood.

Snavel

Zwart.

Ogen:

Donkerbruine iris.

Poten:

Rozebruin met donkere nagels.

Poppen:

Zijn doffer en geelachtiger van kleur. Geen rood aan de keel. Geen gele dwarsband op de lage rug. Zwak blauw op de kruin. Zwak geel op de mantel.

Jonge vogels: Zijn doffer van kleur. Blauwe kruin en gele mantel afwezig. Stuit is groen met iets donkerrode veren. De keel is groen, de snavel hoornkleurig en de poten roze kleurig.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Goede conditie wordt vereist
- o Rode veertjes in de nek zijn foutief.

PATAGONISCHE ROTSPARKIET

Cyanoliseus patagonus patagonus

Lengte:

45 cm

Kop en masker:

Hoofdkleur is olijfbruin. Het bruin aan de kop en de hals is intensiever.

Vleugels:

De vleugelboeg en de vleugeldekenveren zijn olijfkleurig. De buitenste vleugelpennen zijn blauw.

Lichaam:

De zijkanten van de borst hebben een witte tekening. (Bij sommige vogels is deze volledig afwezig) De bevedering in het midden van de buik en op de dijen is matrood. De onderrug, de zijkanten van de buik en de bovenzijde van de dijen zijn geel met een lichte olijfkleurige aanzet. De rode vlek op de buik is omgeven door gele veren.

Staart:

De bovenzijde is olijfgroen en blauw bewaasd. De onderzijde is donkergrijs.

Ogen:

Brede witte naakte oogring met witachtig gele iris.

Snavel:

Zwart.

Poten:


Vleeskleurig met gekleurde nagels.

ONDERSOORTEN:

Cordoba rotsparkiet (*Cyanoliseus patagonus conlara* Nores & Yzurieta 1983)

Zoals de nominaat maar zonder witte tekening aan de zijkanten van de borst. De borstkleur is donkergrijs.

Andes rotsparkiet (*Cyanosiseus patagonus andinus* Dabbene & Lillo 1913) Zoals de nominaat maar de lichaamskleur is donkerder en doffer. De hals is donkerbruin. De borst vertoont geen witte tekening. De buikvlek is donker olijfrood met weinig matgele veren eromheen. De onderrug is vuil olijfgeel.



Keurtechnische opmerkingen:

- o De nominaatvorm en de Andes rotsparkiet komen we praktisch niet meer tegen op onze TT.
- o Cordoba rotsparkiet
- o Aan beide zijden van de keel is meestal een witte vlek zichtbaar. Hier zeker soepel mee omspringen. Voorkeur wordt gegeven aan zuivere keel.

BONTE BOER (SENEGALPAPEGAAI)

Poicephalus senegalus senegalus (Linnaeus 1766)

Lengte:

23 cm

Kop en masker:

De kop is grijs. Op de wangen lichter grijs dan op voorhoofd en schedel.

Vleugels:

De vleugels zijn groen. De onderzijde is geel.

Lichaam:

De bovenzijde is groen. De borst is groen. De buik is geel.

Staart:

De staart is bruinachtig groen.

Ogen:

De iris is geel.

Snavel:

De snavel is grijszwart.

Poten:

Grijsbruin met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Op onze TT zijn de meeste vogels meer oranjegeel. Hier soepel mee omspringen.
- o De geelbuik is kleiner en intensiever van kleur. De kopkleur is fletser.
- o De roodbuik is groter en heeft een minder strakke aflijning. Ook de broekkleur kan verschillend zijn. (kan wijzen op een geslachtskenmerk)

Ondersoorten:

Oranjebuik-Senegalpapegaai: (*Poicephalus senegalus mesotypus* Reichenow 1910)

Zoals de nominaatvorm, maar de buikkleur is meer geeloranje dan geel.



Roodbuik-Senegalpapegaai: (*Poicephalus senegalus versteri* Finsch 1863)

Zoals nominaatvorm maar de buikkleur is oranje-rood



Afrikaanse papegaaien
www.poicephalus.nl

1 **Poicephalus s. senegalus**



Afrikaanse papegaaien
www.poicephalus.nl

2 **Poicephalus s. mesotypus**



Afrikaanse papegaaien
www.poicephalus.nl

3 **Poicephalus s. versteri**

MEYERPAPEGAAI

Poicephalus meyeri meyeri

Lengte:

21 cm

Kop en masker:

Kop is grijsbruin. Op de schedel bevinden zich gele veertjes die een soort band vormen op de kruin.(niet op het voorhoofd)

Vleugels:

De vleugelbocht en de onderste vleugeldekveren zijn geel. De vleugeldekveren en de slagpennen zijn grijsbruin.

Lichaam:

Rug en bovenborst zijn grijsbruin. De onderzijde van de borst en buik is bleekgroen tot groen. De onderrug en de stuit zijn hemelsblauw. De dijen zijn geel.

Staart:

De bovenzijde van de staart is bruin, de onderzijde is donkergrijs. De onderstaartdekveren zijn bleekgroen tot groen.

Ogen:

De naakte oogring is zwart, de iris is oranje-rood.

Snavel:

Zwart.

Poten:

Donkergrijs met donkere nagels.

Jonge vogels:

Vertonen op de rug bruine veren met brede groene omzoming. Alle gele veertjes worden door bruine veertjes onderbroken en zijn nog niet intensief.

o

Keurtechnische opmerkingen:

Gele veertjes op voorhoofd zijn foutief. Mogen enkel op de kruin voorkomen. Voorkeur wordt gegeven aan vogels die geen gele veren hebben op voorhoofd.



Ondersoorten:

	
Oeganda-Meyerpapegaai: <i>Poicephalus meyeri saturatus</i> Groene onderborst en buik//gele veren op kop//stuit is lichtblauw soms groenblauw	Oost-Afrikaanse Meyerpapegaai: <i>Poicephalus meyeri matschiei</i> Onderborst & buik zijn licht tot helderblauw//gele vlek van voorhoofd tot voorbij ogen// Stuit is helderblauw
	
Zuid-Afrikaanse Meyerpapegaai: <i>Poicephalus meyeri transvaalensis</i> Helderblauwe onderborst en buik//gele veren op de kop//helderblauwe stuit.	Damaraland-Meyerpapegaai: <i>Poicephalus meyeri damarensis</i> Helderblauwe onderborst en buik//geen gele kopveren//stuit is helderblauw.
	
Angola-Meyerpapegaai: <i>Poicephalus meyeri reichenowi</i> Onderborst en buik zijn groen met zachte blauwe waas//geen gele veren op kop// stuit is helderblauw	

PRINSES VAN WALES PARKIET

***Spathopterus alexandrae* (Gould 1863)**

Lengte:

40 cm tot 45 cm.

Kop en masker:

De schedel en de omgeving van de ogen zijn zacht zeeblauw. De achterzijde van de kop is geelgroen.

Vleugels:

De vleugels en de schouders zijn geelgroen. Bij de man is aan de derde vleugelpen een spatula. Deze ontbreekt bij de pop.

Lichaam:

De nek, en de rug zijn geelgroen. De stuit is violet. De borst, de keel en een gedeelte van de wangen zijn rozerood. De onderzijde bij de man is licht geelgroen.

Staart:

De geelgroene staart is blauwgroen gebandeerd. Het uiteinde is wit.

Ogen:

Licht oranje met rode irisring.

Snavel:

Rood.

Poten:

Bruin met gekleurde nagels.

POP:

Is matter van kleur. Het blauw van de kop is meer grijsblauw. De snavel is minder rood. De stuit is minder violet van kleur. De spatula ontbreekt.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Jonge vogels lijken op pop.
- o De borstbevedering valt over de schouders bij goede vogels.
- o Kleuregaliteit van bevedering is van belang.
- o Scherpe aflijning bovenzijde keel is noodzakelijke.
- o Bij de man moet de spatula aanwezig zijn. Bij de pop ontbreekt de spatula.
- o Stuitkleur zo diep mogelijk violet. Bij poppen is dit iets bleker.

MUTATIES



Lutino



Blauw



Hebben grijze nerven/vleugelpennen.
Meeste vogels hebben dit niet.(foutief)

Overgoten



Albino

SWIFTPARKIET

***Lathamus discolor* (Shaw 1790)**

Lengte:

25 cm

Kop en masker:

Hoofdkleur: groen. Het voorhoofd, de hals en het voorste deel van de wangen zijn rood. Het rood van de wangen is omzoomd met een dunne gele rand. Achter deze gele rand gaat de kleur over in blauwgroen. De schedel is donkerblauw.

Vleugels:

Overwegend groen. De kleine vleugeldekenveren zijn rood. De vleugelranden zijn donkerblauw. Rode vleugelbocht..

Lichaam:

De borst en de buik zijn geelachtig groen. De rug is grasgroen.

Staart:

De onderstaartdekveren zijn rood. De middelste staartveren zijn bruinrood met een donkerblauwe punt. De buitenste staartveren zijn bleek donkerblauw met een bruinrode gloed.

Ogen:

De ogen hebben een smalle grijze oogring en een oranje iris.

Snavel:

Hoornkleurig bruin.

Poten:

Hoornkleurig grijs met gekleurde nagels.

Pop:


Is fletser van kleur. Hebben over het algemeen een bruingele iris i.p.v. een oranje iris bij de mannen. Ze bezitten altijd een witte vleugelstreep aan de onderzijde van de slagpennen. De veren aan de anaalstreep zijn minder rood en minder aanwezig als bij de mannen.



Keurtechische opmerkingen:

- o Pop is minder intensief van kleur en hebben minder rood op keel, bef en onderstaartdekveren
- o Poppen hebben meestal bruingele iris in plaats van geeloranje
- o Door selectie zijn er vogels met geheel rode borst/buik. Deze worden niet aanvaard.
- o Rode veren op borst en buik zijn foutief
- o Maskerkleur moet diep rood zijn en goed afgelijnd. Rode puntjes ernaast zijn foutief.
- o Vleugeltekening moet symmetrisch zijn
- o Blauwe schedelkleur achter rode voorhoofdsband moet aanwezig zijn

Mutaties:

	
De faded mutatie	De misty mutatie
	
Roodbuik - selectie	

PORT LINCOLNPARKIET

Bernardius zonarius zonarius

Lengte:

37-38 cm

Kop en masker:

Matzwarte kop, de wangen en hals zijn blauw. Dit loopt door tot onder de snavel.

Vleugels:

De bovenste vleugeldekken zijn groen. De vleugelbocht en vleugelranden zijn blauw.

Lichaam:

Op de scheiding van mantel en nek bevindt zich een gele band. De rug is donkergroen, de stuit is blauwgroen, de borst is donkergroen, de buik is geel en de onderbuik is lichtgroen.

Staart:

De bovenstaartdekveren zijn donker groen-achtig blauw en de staart is aan de onderzijde blauw.

Ogen:

Donkerbruin

Snavel:

Hoornkleurig.

Poten:

Grijs met donkere nagels.

Pop:

Is kleiner dan de man en heeft een minder intensieve zwarte kopkleur. De snavel is minder breed dan bij de man.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Een aanwezige rode voorhoofdsband duidt op kruising met Twenty-eightparkiet
- o Heeft een fijne gehamerde tekening op borst
- o Strakke aflijning borst/buik



TWENTY-EIGHTPARKIET

Barnardius zonarius semitorquatus (Quoy & Gaimard 1830)

Verschil met Port Lincolnparkiet:

De groene kleur is donkerder dan bij de Port Lincolnparkiet.

De buik is groen in plaats van geel bij de Port Lincolnparkiet.

Er is een rode voorhoofdsband aanwezig. Dit is niet zo bij de Port Lincolnparkiet.

Hij is duidelijk groter dan de Port Lincolnparkiet.

De pop is fletser van kleur en heeft niet altijd een rode voorhoofdsband.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Een geringe aanwezige groengele kleuraf-scheiding van borst en buik duidt op een kruising met Port Lincolnparkiet.
- o De gele nekband is strak afgelijnd
- o Overgang borst/buik is overvloeiend
- o Bij de pop moeten enkele rode veertjes aanwezig zijn in de voorhoofdsband
- o De gele Twenty-eight bestaat niet. De verschijningsvorm die hiermee wordt bedoeld is niets anders dan een kruising tussen een Twenty-eight en een Port-Lincoln en dus een bastaardvorm.



BARNARDPARKIET

***Barnardius zonarius barnardi* (Vigors & Horsfield 1827)**

Lengte:

35 cm

Kop en masker:

Rode voorhoofdsband, omzoomd door smal geelgroen bandje. De bovenschedel is groen overgaand in olijfgroen naar achteren toe en begrensd door een gele nekband. De wangen en de zijkanten van de hals zijn gedeeltelijk blauw dat doorloopt tot onder de snavel.

Vleugels:

De middelste vleugeldekveren zijn donker groenblauw. De vleugelbocht en de buitenste vleugeldekveren zijn helder blauwgroen, de vleugelranden zijn diep ultramarijnblauw. De grote vleugeldekveren zijn zwart met blauwe buitenvlag.

Lichaam:

Groen. Hals, borst en buik dijen en anaalstreek zijn groen, de rug donkergroen. De mantelveren zijn donker groenblauw. In het midden van de borst bevindt zich een vrij brede gele band waarin ook oranjekeurige veren kunnen in voorkomen.

Staat:

De bovenstaartdekveren zijn licht blauwgroen en de onderstaart is bleekgroen. De bovenste grote staartveren zijn blauw.

Ogen:

Donkerbruin.

Snavel:

Lichtgrijs.

Poten:

Grijs met donkere nagels.

Pop:

Is fletser van kleur. De man heeft een bredere snavel.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Gele nekband is niet zo strak afgelijnd en mag in het midden onderbroken en groen zijn. De voorkeur wordt gegeven aan vogels met een duidelijk afgelijnde nekband.
- o Ontbreken van buikband is foutief
- o De buikband is niet strak afgelijnd en kan variëren in kleur van geel tot rood maar moet zo egaal mogelijk van kleur zijn

CLONCURRYPARKIET

Barnardius zonarius macgillivrayi (North 1900)

Verschil met Barnardparkiet:

Bleker groen van kleur dan *barnardi*. Ook de rug is bleekgroen van kleur (Bij de *barnardi* is de kleur groen). De wangen en andere oordekken zijn lichtblauw. De buik is bleekgeel (bij de *barnardi* is de buikkleur groen met een gele band). De kleine vleugeldeken zijn groen en het voorhoofd is licht geelgroen (Bij de *barnardi* is een rode voorhoofdsband aanwezig).

Pop:

Is meer grijsgroen op vleugeldeken (man is lichtgroen). Over het algemeen minder sprekende kleuren dan bij de man. Gezien het minieme verschil wordt het geslacht bepaald door DNA.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Kleur moet zo egaal mogelijk zijn
- o De borst en het vleugeldeken zijn licht gehamerd
- o De pop is iets minder intensief van kleur
- o De gele nekband is strak afgelijnd
- o De buikkleur is niet zo strak afgelijnd

Port Lincolnparkiet	Twenty-eightparkiet
	
	
Kruising Port Lincolnparkiet x Twenty-eightparkiet	
Barnardparkiet	Cloncurryparkiet
	

JENDAYAPARKIET

Aratinga (Aratinga) jandaya (Gmelin 1788)

Lengte:

30 cm

Kop en masker:

Kop, nek en bovenzijde borst is oranjegeel.

Vleugels:

Het vleugeldek is donkergroen. De hand- en armpennen zijn evenals de primaire vleugeldekveren donkergroen met een violetblauwe buitenvlag.

Lichaam:

Oranjegeel van bovenborst gaat over naar oranjerood voor de rest van het onderlichaam. De mantel is donkergroen. Het onderste deel van de onderrug is oranjerood. De dijen en de anaalstreek zijn groen, hier en daar onderbroken door oranjerode en oranjegele veerzompjes.

Staart:

De onderstaartdekveren zijn donkergroen. De onderzijde van de staart is grijszwart. De bovenzijde van de staart is olijfgroen overgaand in donkerblauw naar de uiteinden toe.

Ogen:

Naakte grauwbruine oogring, iris is bruin.

Snavel:

Grijszwart.

Poten:

Grijze poten met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Goede conditie wordt vereist
- o Borstzone moet zo zuiver mogelijk zijn
- o Vleugeldek moet zuiver van kleur zijn
- o Ongeschonden zwarte snavel
- o Donkere poten en nagels

ZONPARKIET

***Aratinga (Aratinga) solstitialis* (Linnaeus 1758)**

Lengte:

30 cm.

Kop en masker:

Het voorhoofd, het gebied rond de ogen, de teugels en de oorstreek zijn oranjerood. De wangen, de schedel en de nek zijn maisgeel.

Vleugels:

Het vleugeldekk is maisgeel. De primaire vleugeldekkveren zijn donkerblauw en de secundaire zijn donkergroen met geelgezoomde punten. De hand- en armpennen zijn donkergroen, de handpennen naar het einde toe overgaand in donkerblauw.

Lichaam:

De bek de borst en de mantel zijn maisgeel. Deze kleur gaat over in dieporanje op de buik, flanken en dijen. De stuit is geel tot oranjeachtig.

Staart:

De bovenstaartdekveren zijn geel tot oranjeachtig. De onderstaartdekveren zijn groen met gele veerzompjes. De bovenzijde van de grote staartveren is olijfgroen naar het einde toe overgaand naar donkerblauw. De onderzijde van de staartpennen is grijsachtig.

Ogen:

De ogen zijn omgeven door een naakte witte ring. De iris is donkerbruin.

Snavel:

Zwartgrijs

Poten:

Grijs met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Goede conditie wordt vereist
- o Schouderbevedering mag geen groene bevedering vertonen.
- o Snavel moet zuiver zijn en zwart van kleur
- o Donkere poten en nagels



NANDAYAPARKIET

Aratinga (Nandayus)nenday (Vieillot 1823)

Lengte:

30 cm

Kop en masker:

Kop is met uitzondering van de oorstreek zwart. De nek, de oorstreek en de zijkan-
ten van de hals zijn donkergroen. De
groene veren op de bief en de borst zijn
blauw omzoomd. Deze bevedering lijkt
hierdoor blauw bewaasd.

Vleugels:

De hand-en armpennen zijn groen en
hebben een donkerblauwe buitenvlag.

Lichaam:

De rug, de buik, de stuit, de flanken en de anaal-
streek zijn groen. Het onderste gedeelte van de dijen
is helderrood.

Staart:

De bovenzijde van de staart is olijfgroen met don-
kerblauwe uiteinden. De onderzijde is groen evenals
de boven- en onderstaartdekveren.

Ogen:

De naakte oogring is grijs. De iris is donkerbruin.

Snavel:

De snavel is zwart. De bovensnavel is lang en sterk gebogen. Een diepe inkeping is
merkbaar op het snijvlak.

Poten:

Rooskleurig met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen:

- o Een lichte donkere omzoming op het vleugeldek is toegelaten.
- o Masker moet afgelijnd zijn
- o Verzorgde donkere snavel

ROODVOORHOED KAKARIKI

***Cyanoramphus novaezelandiae* (Sparrman 1787)**

Lengte:

28 cm(man)-26 cm (pop)

Kop en masker:

Het vo Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.

Voorhoofd en de schedel zijn rood. Dit loopt vanaf het voorhoofd tot in een streep achter het oog.

Vleugels:

Groen, een nuance donkerder dan lichaam. De buiten-vleugelpennen zijn violetblauw. De duimveertjes zijn violetblauw.

Lichaam:

Groen. De borst en de buik zijn meer geelachtig groen. Op de flanken bevinden zich rode vlekken.

Staart:

De bovenstaartdekveren zijn groen. De onderstaartdekveren zijn geelachtig groen. De staartpennen zijn groen.

Ogen:

Zwart met rode iris.

Snavel:

Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.

Poten:

Grijs met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen:

- o De man is over het algemeen groter dan de pop.
- o Zwart pigment op de vleugels is foutief.
- o Bonte nagels zijn foutief.
- o Achter het oog vormt zich een omgekeerde driehoek.

GEELVOORHOOFDKAKARIKI

***Cyanoramphus auriceps* (Kuhl 1820)**

Lengte:

23 cm

Kop en masker:

Smalle rode voorhoofdsband tot aan het oog. De schedel is goudgeel van kleur.

Vleugels:

Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De buitenvleugelpennen zijn violetblauw. De duimveertjes zijn violetblauw

Lichaam:

Groen. De borst en de buik zijn meer geelachtig groen. Op de flanken bevinden zich rode vlekken.

Staart:

De bovenstaartdekveren zijn groen. De onderstaartdekveren zijn geelachtig groen. De staartpennen zijn groen.

Ogen:

Zwart met rode iris.

Snavel:

Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.

Poten:

Grijs met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen

- o De man is groter dan de pop.
- o Zwart pigment op vleugels is foutief.
- o Bonte nagels zijn foutief.
- o Achter het oog vormt zich soms een gele driehoek. Dit is geen fout.



BERGPARKIET

***Polytelis anthopeplus anthopeplus* (Lear 1831)**

Lengte

40 cm

Kop en masker

Voorhoofd, boven- en achterschedel zijn olijfgeel. De wangen en de keel zijn goudgeel.

Vleugels

De vleugelbocht en de buitenste vleugeldekteertjes zijn geelgroen. De andere vleugeldekteertjes zijn donker olijfgroen. De secundaire grote vleugeldekteertjes zijn karmijnrood en meestal geel omzoomd. De vleugelpennen hebben een donkerblauwe buitenvlag.

Lichaam

De borst, buik, flanken, dijen en aars zijn goudgeel.

De mantel en de bovenrug zijn donker olijfgroen met lichte omzoming.

De rug en de stuit zijn geelgroen.

Staart

De bovenste grote staartpennen zijn blauwachtig zwart. De onderste grote staartpennen zijn diep zwart met oranje-rode uiteinden.

Bij de pop zijn de bovenste grote staartpennen groenachtig blauw.

De onderste grote staartpennen zijn zwartgrijs met roze uiteinden.

Ogen

Bruin met donkere iris.

Snavel

Rozerood en naar de punt toe dieper rood.

Poten

Grijs met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen

- o Jonge vogels lijken op de pop.
- o Het rood van de vleugels mag niet uitvloeien in de lichtgroene vleugelspiegel. Deze moet mooi afgelijnd zijn.
- o Zwart pigment in de vleugelspiegel is foutief.

Mutaties

lutino



gezoomd



pastel gezoomd



gezoomd



turquoise



BARRABANDPARKIET

***Polytelis swainsonii* (Desmarest 1826)**

Lengte

40 cm

Kop en masker

De kop is overwegend groen. Het voorhoofd en het masker zijn geel met ter hoogte van de keel een scharlakenrode band. De boven- en achterschedel zijn blauw.

De kop van de pop is voornamelijk groen tot blauwgroen.

Vleugels

Groen. De slagpennen zijn blauw.

Lichaam

Overwegend groen. Bij de pop komen rode veertjes voor aan de dijen.

Staart

Bij de man is deze groen met blauwe omzoming.

Bij de pop bezit de onderzijde van de staart veel roze.

Ogen



De iris bij de man is oranjegeel. Bij de pop is deze bruin.

Snavel

Oranjerood.

Poten

Grijs met donkere nagels.



Keurtechnische opmerkingen

- o Jonge mannen lijken op de pop en zijn meestal te herkennen aan bruine veertjes op de keel.
- o Kleuregaliteit is van belang.
- o De koptekening bij de man moet geel zijn. Oranje of rode waas zijn foutief.
- o De kleurafscheiding tussen de gele wangen en de rode keelstreep mag geen oranje overgang hebben.
- o Er moet een duidelijk blauwe waas aanwezig zijn op de bovenschedel bij de man