



STANDAARDEISEN

DAG- & NACHTROOFVOGELS



UITGAVE 2013

Inhoud	
Voorblad	
Algemeenheden	
Afrikaanse oehoe	<i>Bubo africanus</i>
Amerikaanse torenvalk	<i>Falco sparverius</i>
Bengaalse oehoe	<i>Bubo benglensis</i>
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>
Dwerg uil	<i>Glaucidium passerinum</i>
Europese Buizerd	<i>Buteo buteo</i>
Europese dwergooruil	<i>Otus scops</i>
Europese oehoe	<i>Bubo bubo</i>
Gepareld dwerguiltje (Afr.)	<i>Glaucidium perlatum</i>
Giervalk x sakervalk	<i>Falco rusticolus x Falco cherrug</i>
Havik	<i>Accipiter gentilis</i>
Kaapse oehoe	<i>Bubo capensis(mackinderi)</i>
Kerkuil Tyto Alba alba	<i>Tyto Alba alba</i>
Kerkuil zwart	<i>Tyto tenebricosa</i>
Konijnenuil	<i>Athen Cunicularia</i>
Koningsbuizerd	<i>Buteo regalis</i>
Lapland uil	<i>Strix nebulosa</i>
Lizard buizerd	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>
Melk oehoe	<i>Bubo lacteus</i>
Nieuw Zeelandse Boekboek	<i>Ninox novaeseelandiae</i>
Ransuil	<i>Asio otus</i>
Roodstaart buizerd	<i>Buteo jamaicensis</i>
Sakervalk	<i>Falco cherrug</i>
Siberische oehoe	<i>Bubo bubo Sibericus</i>
Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>
Sneeuwuil	<i>Bubo scandiacus</i>
Sperwer musket	<i>Accipiter nincus</i>
Sperwer wijf	<i>Accipiter nincus</i>
Sperweruil	<i>Surnia ulula</i>
Steenarend	<i>Aquila chrisaetos</i>
Steenuil	<i>Athene noctua</i>
Torenvalk tarsel	<i>Falco tinnunculus</i>
Torenvalk wijf	<i>Falco tinnunculus</i>
Velduil	<i>Asio flammeus</i>
Witwangdwergooruil	<i>Octus leucotis</i>
Woestijnbuizerd	<i>Parabuteo unicinctus</i>

Kenmerken en benamingen






Foto Rob Olivier NL

Meest voorkomende benamingen specifiek bij roofvogels

Masker	Meestal bij nachtroofvogels maar ook bij bv kiekendieven .
symmetrie	Zo gelijkmatig mogelijk verdeeld
Snor	Langere bevedering rond en of onder de snavel
Tekening in druppelvorm	Vlekjes fijn beginnend langs boven en dikker wordend tot druppelvorm naar onder toe



Sluier	meestal hartvormig bij de uilen
Pareltekening	fijne tekening meestal op de kop
Oorpluimen	meestal bij uilen
Blokken	meest voorkomend op de staart
Been en voet en teenbevedering	kort en of lang bevederd
Vleugel vlekken Vleugelbanden	Klein en of groot maar zoveel mogelijk in symmetrie



Specifieke benamingen bij nachtroofvogels

Gezicht: masker – bril

A

Sluier : hartvormig,
concentrische ringen .

B

Oog : ring – iris – pupil

C

Snavel : boven – onder –
hoornkleurig.

D

Neus : dop – snor.

E

Wang : vlek – streek –
band .

F

Schedel , nek : gepareld.

G

Oor : pluimen – opening .

H

Kin , keel : vlek – band .

I

Poten , tenen : bevederd

J

Rug : dekveren - vlekken -

K

Staart : vlekken- banden -
blokken .

L


Aars, stuit (M1): streek

M

Vleugel: bocht , banden

N

Borst , buik : horizontale en verticale bestreping ,banden (O) - gebogen ,
driehoekig , druppelvorm



WAT ZIJN STANDAARDEN

Een standaard is een document met beschrijvingen van voorwaarden waaraan bepaalde vogels moeten aan voldoen op een tentoonstelling .
Ras per ras en soort per soort .
Deze standaarden worden opgemaakt door erkende keurmeesters bevoegd in hun specialiteit .
Rekening houdend met deze standaarden worden door de keurmeesters een puntenwaarde toegekend aan de vogels individueel , in stam of in stel .
Op deze manier wordt de liefhebber op de hoogte gebracht van hoedanigheden, kwaliteiten en gebreken van zijn vogel(s).
Ook kan op deze manier een klassement worden opgemaakt en kampioenen worden aangeduid .

WAT IS HET “KEUREN VAN EEN VOGEL”

Keuren is, na het beoordelen van de kwaliteiten en gebreken die de vogel toont t.o.v. de geldende standardeisen, een puntenwaarde toekennen.
Als keurmeester mag men nooit rekening houden met het wedstrijd karakter die een tentoonstelling kan hebben. Alleen door het keuren naar de geldende standardeisen kan een zekere eenvormigheid bekomen worden onder de keurmeesters.
Het K.B.O.F.-keursysteem is er op gericht dat elke vogel die op de keuring aanwezig is afzonderlijk wordt beoordeeld en dat er per vogel een keurfiche wordt opgemaakt.

DE KEURFICHE



De keurfiche is een officieel document dat de verbinding is tussen keurmeester en deelnemer enerzijds en tussen de keurmeester en de inrichters anderzijds.

2013



Koninklijke Belgische Omithologische Federatie v.z.w.
KEURFICHE: DAG & NACHT ROOFVOGELS

Benaming:

		Klas					A B C D E Reeks					
Keurrubrieken	Schaal		Kooinummer (s)			1. Dagroofvogel	2. Nachtroofvogel					
	1	2				Positieve punten:						
Tekeningpatroon	30	30										
Kleur	10	10										
Vorm / Grootte	20	20										
Bevedering	20	10										
Houding	10	20										
Conditie	10	10										
Totaal	100	100										
Stel of stamharmonie						EP / Kampioen						
Algemeen totaal												
Opmerkingen:												
* Europese						Datum						Handtekening / Stempel
* niet Europese												
* Tarsel												
* Vrouwe												

HET PUNTENSYSTEEM

Hoewel een vogel beoordeeld wordt op een maximum van 100 punten, zal geen enkele vogel, gedurende de keuring, hoger mogen gequoteerd worden dan 90 punten. Men neemt aan dat geen enkele vogel het ideaalbeeld bereikt en kent als basis in elke rubriek 90% van de toe te kennen punten toe die op de keurfiche voorkomt.
Na het toekennen van een EP kunnen pluspunten gegeven worden rekening houdend met het reglement op de tentoonstelling .
Elke fout, die men bestraft, zal leiden tot een minder aantal punten in de rubriek.

STAM- EN STELKEURING

Wat is een stam (wetenschappelijk)?

Een stam is een groep vogels behorende tot dezelfde soort, ras, kleurslag en geslacht.

Wat is een T.T.- stam?

Een T.T. - stam bestaat uit vier vogels die specifiek dezelfde waarneembare eigenschappen bezitten.

Wat is een stel (wetenschappelijk)?

Een stel is twee vogels behorende tot dezelfde soort, ras, kleurslag en geslacht.

Wat is een T.T.- stel?

Een T.T.-stel bestaat uit twee vogels die specifiek dezelfde waarneembare eigenschappen bezitten

Latijnse benaming : **Bubo africanus**

Nederlandse benaming : **Afrikaanse oehoe**



Gaven en pluspunten;

Heldere ogen en goede symmetrie ,mooie oorpluimen

Meest voorkomende fouten ;

Te onregelmatig gevlekt

Algemeen: Kleiner dan de Europese oehoe (45 tot 48 cm) met veel keurenvariatie , sommigen zijn meer donkerbruin-grijsachtig anderen hebben een bleek grijsachtige grondkleur.

Ogen : groot en geel met lichtgroene of oranje schijn volgens de kleurslag , juist boven de ogen bevind zich een klein bleek streepje(A)

Snavel : zwart en langs weerszijden zwaar bleek bevederd . Onder de snavel ziet men een V vormige kin bevedering.

Gezicht : de bleke snavelbevedering loopt verder door omhoog tot voorbij het middelste van de ogen (bij blekere exemplaren is dit meer zichtbaar = pluspunt) .

Wangen :de grijsbruine fijn gestreepte wangen hebben een dikke donkere aflijning.

Voorhoofd : bruinachtig-grijs met de V vormige oog bestreping en kleine bleke gespikkelde vlekjes die kleiner worden naar de kruin .

Rug: vaal- zwartbruin tot grijsachtig met grote bleke vlekken

Vleugels en schouderbocht: bruin tot grijs met zware bleke vlekken , de slagpennen hebben blekere banden op de grondkleur.


Borsten flanken en onderstaart : bruin tot grijsbruin met vaalbruine horizontaal lopende gebogen bestreping .

Loopbeen en tenen : bevederd .

Klauwen : zwart

Latijnse benaming : **Bubo benglensis**

Nederlandse benaming : **Bengaalse oehoe**



Gaven en pluspunten;

Heldere ogen en goede symmetrie

Meest voorkomende fouten ;

Te onregelmatig gevlekt

Algemene lichaamskleur : veel keurenvariatie , sommigen zijn meer bruin anderen hebben een bleek geelachtige grondkleur

Wenkbrauwen :beginnen witachtig in het midden van het gezicht en veranderen in een zwartachtige lijn in een punt net boven het midden van elk oog en dan verder omhoog naar de donkere oorpluimen .

Voorhoofd is bruinachtig met kleine zwartachtige en gespikkelde vlekjes die in aantal groter worden naar de kruin

Ogen : oranjegeel tot oranjerood .

Rug vaalbruin tot zwartbruin gevlekt en gestreept op de vaalwitte beige ondergrondkleur, meestal is er een witachtige band aan de schouder. **(A)**

Vleugels: bruin met donkere midden banden ,eindbanden en lichter tussen liggend horizontaal bruin en fijn geband .

Gezicht :bleke wangen met een dikke donkere band.

Snavel :bevederd en zwart.

Kin en keel : wit tot vaalwit

Borst en flanken :bleek aan de keel en bruiner naar onder toe donker zwaar gestreept in de borst en fijnere gebogen horizontale bestreping op de buik , flanken en aarsstreek

Loopbeen en tenen :bevederd , de buitenste gewrichten van de tenen zijn kaal met een groenachtige schijn .

Klauwen : zwart

Bleke party in de midden borst is niet foutief ! **(B)**

grootte : kleiner dan de Europese oehoe .

Latijnse benaming : **Falco subbuteo**

Nederlandse benaming : **Boomvalk**



Wijf



Tarsel

Gaven en pluspunten;

Symmetrische tekening , mooie baardstreep

intensieve kleur en goed contrast

Meest voorkomende fouten ; te onregelmatig gevlekt

Algemene lichaamskleur- **Tarsel** : donkergrijze bovenzijde en witachtige gevlekte onderzijde.

Kop : grijszwart ,zwart-witte koptekening .

Baardstreep: zwart

Oog : gele oogring met donkerbruine iris , bleke wenkbrauw streep.

Snavel kleur :grijze basis en zwart naar de punt toe .

Neus : eigeel

Wangen : bleke wangvlek, deze achter het oog omhoogstekende vlek is typisch voor de boomvalk.

Keel : vaalwit tot wit

Nek: donker met meestal lichtere vlekken (eigenschap om elkaar te herkennen (= geen bont --- niet foutief !)

Rugdek : donker grijsbruin en zeer lichtbruin omzoomd .

Vleugels : grijs-zwart ,lang ,spits en sikkelvormig bovenaan grijs en onderaan volledig getekend ..

Borst en flanken : de boven borst is roomwit met fijne verticale bestreping

Buik en flanken zijn vaalwit met zware lengtestrepen

Aars : roestkleurig

Staart : grijs en lichtbruin geband , de onderstaart en broek zijn roestbruin .

Poten : diep eigeel met zwarte teennagels

Wijf: bezit dezelfde eigenschappen maar is groter .

Verschil adult- juveniel :juveniel is veel bruiner van kleur , de onderzijde is meer crèmekleurig in plaats van wit en een blauwgrijze washuid i.p.v gele bij de adult.

Latijnse benaming : **Glaucidium passerinum**

Nederlandse benaming : **Dwerguil**



Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige rug en borst tekening .

Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .

Algemene lichaamskleur :bruine tot bruingrauwe bovenzijde met bleke vlekken en vaalwitte onderzijde met donkere vlekjes en streepjes .

Grootte : tarsel : 17 cm , wijf 19 cm (kop kleiner dan steenuil)

Snavel: lichtgrijze basis en licht hoornkleurig naar de top toe .

Kop :bruin met vaalwitte vlekjes en streepjes .

Oogkleur : geel met zwarte pupil.

Neus :vaalwitte bevedering die verder loopt naar de wenkbrauwen .

Gezicht en wangen: vaalwitte vlekjes en lijntjes .

Rugdek : bruin tot bruingrauw met regelmatig verdeelde vaalwitte –lichtbruine vlekjes .

Vleugels : donkerder en gevlekt.

Borst :Vaalwitte ondergrond met een mindere bruine lengte bestreping .

Flanken : meer warm bruin met vaalwitte tot lichtbruine vlekjes.

Poten : geel met donker tot zwarte teennagels.

Staart : bruin tot bruingrauw met vijf smalle vaalwitte dwarsbanden.

Gedrag : bij opwinding typische op en neer en zijdelingse staartbewegingen .

Verschil in geslacht : niet merkbaar

Latijnse benaming : **Buteo buteo**

Nederlandse benaming : **Buizerd**



Meest voorkomende fouten ; te vlekkerig en assymetrisch

:geschonden hoorndelen

Gaven en pluspunten; Levendige ogen en zoveel mogelijk symmetrische tekening

Algemene lichaamskleur : grote variatie van vuilwit-bruin gevlekt en gestreept tot donkerbruin-zwart met vuilwitte omzoming

Alle varianten hebben een donkere vlek aan de onderzijde van de vleugel

Koptekening : bleek tot bruine ondergrond met vuil-donkerder vlekjes en streepjes

Oog en iris : bruin tot vaalgeel met donkere iris - jonge vogels hebben een lichtere iris kleur

Snavel kleur : eigeel met zwarte punt

rugdek : vuilwitte ondergrond met bruine tot zeer donkere veertjes die lichter omzoomd zijn

vleugels : de schouders zijn fijn licht gevlekt in lichte of donkere kleur

Lange vleugelpennen : zijn meer effen van kleur

stuit en staart : staartbasis is bleek , rugkleur met dwarsbanden en bleke eindband
de stuit is meer gevlekt

keel :over het algemeen bleek en licht gevlekt en gestreept

borst en flanken :lichtste kleur van de vogel met vlekken en streepjes in een V vorm

poten en teennagels : eigeel met zeer donkere teennagels

verschil in geslacht : geen (vrouwtje over het algemeen iets zwaarder)

Latijnse benaming : **Octus scops**

Nederlandse benaming : **Europese dwergooruil**



Pluspunt : mooi opstaande oorpluimen in werkhouding

Goed verdeelde en symmetrische vlekken

Opmerkingen : te liggende of bange houding

Algemene : roodbruine tot bruingrauwe bovenzijde met bleke vlekken en vaalwitte onderzijde met donkere vlekjes en streepjes. meestal rechte houding

Grootte : 20 cm (iets kleiner dan de steenuil).

Kop : bruin grijs beige-bruin met donkere vlekjes en streepjes .

Oogkleur : geel met oranje schijn en zwarte pupil.

Snavel : lichtgrijze basis en licht hoornkleurig naar de top toe .

Neus : zwaar bevederd.

Wenkbrauwen : vaalwit- grijs tot bruinachtige bevedering die verder loopt boven het oog naar de oorpluimen toe .

Gezicht en wangen : vaalwitte kleur met fijne donkerder vlekjes en streepjes .

Rugdek : bruin tot bruingrauw met regelmatig verdeelde vaalwitte verticaal lopende vlekken.

Vleugels : lang en smal donkerder bruingrijs met vaalwit- beige bleke in de lengte lopende vlekken en een bleke schouderstreep .

Borst en flanken : bruin grijze ondergrond met fijne donkere lengte bestreping .

Poten : geel met donker tot zwarte teennagels.

Verschil in geslacht : niet merkbaar



Positieve punten ; intensieve kleur

Mooie symmetrische vlek en streeptekening

Europese Oehoe ; Bubo Bubo

Voorhoofd ; bleek aan de neus , donker gestreept en gevlekt naar de schedel en nek

Ogen : variëren van felgeel tot vuuroranje iris met donkere pupil

Oor pluimen ; groot en lang , donkere kleur met bruinachtige boven pluimpjes

Snavel: zwart

Baard ; onder de snavel is een vuilwitte snor vlek

Borstkleur ; in het midden is een bleke vlek , de kleur is okerkleurig –bruin

Borst tekening ; verticale vlekken en strepen (hoe verder naar onder toe hoe beter) en verticale fijnere dwars bestreping

Rug ; bruin tot donker met donkere vlekken die lichter omzoomd zijn

Vleugels in dezelfde kleur met een duidelijk symmetrische band tekening

Poten ; zwaar bevederd

Teennagels ; donker grijs tot zwart

Opmerkingen ; geschonden hoorndelen

Agressieve houding , onregelmatige tekening



Siberische oehoe



Bengaalse oehoe



Europese oehoe



Canadese oehoe



Afrikaanse oehoe



Woestijn oehoe



Amerikaanse oehoe



Kaapse oehoe



Coromandel oehoe



Kleine oehoe

Latijnse benaming : **Glaucidium glaucidium**

Nederlandse benaming : **Gepareld dwerguiltje**



Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige rug en borst bestreping

Onderbroken wenkbrauwtekening

Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .

Mooi geparelde kop

Algemeen :herkomst :Afrika , bruine tot bruingrauwe bovenzijde met bleke vlekken en vaalwitte tot bruinachtige onderzijde met donkerder zware bestreping. .

Grootte : 19 cm

Snavel: licht groen-geel hoornkleurig ,onder de snavel bevindt zich een V vormige bleke streep.

Kop : grijs tot grijsbruin met vele mooi verdeelde vaalwitte vlekjes.

Oogkleur : geel met zwarte pupil.

Neus :vaalwitte bevedering die verder loopt naar de wenkbrauwen , deze tekening loopt tot voorbij het middelste van het oog.

Gezicht en wangen: vaalwitte vlekjes en lijntjes .

Rugdek : bruin tot bruingrauw met regelmatig verdeelde vaalwitte lichtbeige-bruine vlekjes .

Vleugels : donkerder en gevlekt.

Borst :bovenborst lichter gespikkeld, dan verder vaalwitte tot bruinachtige ondergrond met zware bruine lengte bestreping .

Flanken : meer warm bruin en vaalwit tot lichtbruin gestreept.


Poten : bevederd ,geelgroenachtige tenen met donker tot zwarte teennagels.

Staart : redelijk lang , bruin tot bruingrauw met vijf smalle vaalwitte dwarsbanden.

Verschil in geslacht : niet merkbaar

Latijnse benaming : **Falco rusticolus x Falco cherrug**

Nederlandse benaming : **Giervalk x Sakervalk**



Meest voorkomende fouten ; te weinig kenmerken van een van de ouders , te zware bestreping tot in de keel

Gaven en pluspunten; duidelijke kenmerken van beide ouders / goede symmetrische tekening

Bijzonderste kenmerken:

Giervalk : de grootste en zwaarste onder de valken , de kleur varieert van grijs , grijsbruin tot vrijwel sneeuwwit in de noordelijke gebieden
De baardstreep is erg smal en ontbreekt bijna bij de witte vogels.
De bredere en niet zo spitse vleugels onderscheiden hem van de slechtvalk

Juveniel ; effen aan de bovenkant en lichte grondkleur onderaan met donkere lengtevlekken .

Sakervalk : de bovenzijde is rosachtig-bruin , de kop is lichter en fijn gestreept ,de borst is zwaar getekend ,fijne donkere baardstreep, de onderkant is vaalwit met bruine vlekken.

De snavel is blauwgrijs ,de washuis is geel ,poten geel.

Oog: oogring is geel de iris is donkerbruin

Staart : bruin met ovale vaalwitte vlekken

Hand en armpennen : bijna zwart van boven

Poten : gele ½ tot ¾ bevederde loopbenen met dikke klauwen en zwarte teennagels

* **Kruisingen hiervan komen ook in de natuur voor !**


* **Kruisingen moeten kenmerken van beide ouders vertonen !**

* **Een kruising kan enkel kampioen spelen als daarvoor een aparte titel voorzien is (anders maximum een EP)**

* In de neusgaten zitten schotjes om de verandering van luchtdruk op te vangen bij snelle manoeuvres en duiken .

* Onder de ogen bevinden zich donkere veertjes die de weerkaatsing van het felle zonlicht verminderen(beter zicht)

Foto kruising : Rob Olivier (NL)* toelating V.W



De **Sakervalk** is groter dan de slechtvalk, bovenzijde rossig bruin, kop lichter, donkerder gestreept en smalle, donkere baardstreep, onderkant witachtig met bruine vlekken, snavel blauwgrijs, washuid geel, poten geel, iris donkerbruin. Beide geslachten gelijk gekleurd, vrouwtje groter.


Bij de **Giervalk** ziet men minder borsttekening en is meestal grijsachtig vuilwit

Bij de **Sakervalk** ziet men meer baardstrepen en is meer bruinachtig

Bij de Kruising ziet men de drie kenmerken maar wel gereduceerd

Latijnse benaming : **Accipiter gentilis**

Nederlandse benaming : **Havik**



Meest voorkomende fouten ; te geelachtige ogen bij adult

Gaven en pluspunten; mooie koekoekstekening

Algemene lichaamskleur : de tarsel is bovenaan bruinachtig grijs
De onderzijde is vaalwit met dunne donkerbruine dwarsstrepen

Kop: grijsbruin en wat bewolkt met de vaalwitte ondergrond .

Nek, rug en schouders: bruingrijs bij de tarsel en leigrijs met een bewolkte omzoming bij het wijf .

Vleugels : breed en afgerond , donkerder dan de rug met een lichte afzoming.

Oog : oranjerood tot soms dieprood donkere iris .

Neus : geel met lichtgroene schijn

Snavel : grijs aan de basis en donker tot zwart naar de top.

Wenkbrauwstreep : vaalwit , breed , beginnend voor het oog en lopend tot goed voorbij het oog tot zijdelings het achterhoofd .

Keel: grijs met fijne verticale streepjes

Rug : meer bruingrijs bij de tarsel en leigrijs bij het wijf

Borst , buik, flanken : koekoekstekening ; lichtgrijs met donkere tot horizontale gebogen bestreping .

Aarsstreek: zeer lichtgrijs tot wit.

Staart : grijs met donkere dwarsbanden .

Onderzijde : bijna volledige koekoekstekening .

Poten : lang en geel .

Teennagels : zwart

Verskil in geslacht : wijf is meer dan $\frac{1}{4}$ groter dan de tarsel .
(tarsel +/- 48 cm --- wijf tot 60 cm .)

Kenmerkend verschil met Sperwer : dikkere oogstreep en roodoranje tot rode ogen (sperwer = geel oog)

Juveniel : = boven meer bruin verenkleed en onderaan bruin gestreept / onopvallende wenkbrauwstreep

Latijnse benaming :

Nederlandse benaming : **Kaapse oehoe**



Gaven en pluspunten;

Heldere ogen en goede symmetrie ,mooie oorpluimen

Meest voorkomende fouten ;

Te onregelmatig gevlekt

Algemene lichaamskleur : veel keurenvariatie , sommigen zijn meer bruin anderen hebben een bleek grijs-geelachtige grondkleur

Wenkbrauwen : beginnen vaal-witachtig in het midden van het gezicht en veranderen in een zwartachtige lijn in een punt net boven het midden van elk oog en dan verder omhoog naar de donkere oorpluimen .

Voorhoofd : bruinachtig met kleine zwartachtige en gespikkelde vlekjes die worden naar de kruin .

Ogen : oranjegeel tot oranjerood .

Rug en vleugels: vaalbruin tot zwartbruin gevlekt en gestreept op de vaalwitte bruin- beige ondergrondkleur ,op de vleugel bevindt zich ook een verticale spiegelband in grotere vaal witte vlekken.

Gezicht grijsbruine fijn gestreepte wangen met een dikke donkere band.

Snavel : zwart.

Kin en keel :bruin grijs met fijne streepjes en een vaalwitte tot witte lijn in de keel tot onder de wang


Borsten flanken :onder de vaalwitte streep bevinden zich donkere vlekken in de bruine geelachtig tot vaalwitte ondergrond , deze vlekken verkleinen naar onder toe , deze gaan op de buik over in fijne gebogen horizontale bestreping

Loopbeen en tenen :bevederd . **Klauwen :** zwart

Bleke party in de midden borst is niet foutief !

Latijnse benaming : **Tyto Alba alba**

Nederlandse benaming : **Kerkuil**



- Open sluier (C)
- Kromme neuslijn (D)
- Te grauwe borst

Gaven en pluspunten;

Mooie pareling , rechte neuslijn , goede symmetrie

Heldere kleur, mooie hartvormige gesloten sluier = foto A

Meest voorkomende fouten ;

Tegenovergestelde van de pluspunten

Algemene lichaamskleur :zo bleek mogelijk

*Vrij zeldzaam in Nederland en België

Kop :vanaf zeer lichtbruin, licht oranje tot zeer licht asgrijs (B)

Schedel: zeer fijn en symmetrisch gepareld tot achter de nek

Masker, sluier: hartvormig en volledig wit

Borst , flanken en onderzijde : volledig wit

Rug en vleugels : vanaf zeer lichtbruin, licht oranje tot zeer licht asgrijs met iets dikkere naar onder lopende spikkeling en vlekjes en dwarse bestreping .

Pennen: over de slag en armpennen lopen brede dwarsbanden

Iris: donker tot zwart

Snavel :hoornkleurig . **Traanstreep** : roestachtig

***Gehooropeningen** : zitten op verschillende hoogtes

vleugels : zeer lichtbruin tot licht asgrijs

Loopbeen : lang en bevederd , licht geel grijs tot geel met zwarte teennagels

verschil in geslacht : wijfje ... normaal groter dan de tarsel

Type Tyto overgoten is volledig wit




Foto A : Rob Poliste (NL)

Toelating * V.W

Latijnse benaming : **Tyto tenebricosa**

Nederlandse benaming : **Zwarte Kerkuil**



Gaven en pluspunten;

Mooie pareling , rechte neuslijn , goede symmetrie

Mooie hartvormige sluier

Meest voorkomende fouten ;

Tegenovergestelde van de pluspunten

Algemene indruk : klein tot middelgroot (twee soorten * de grote en kleine zwarte kerkuil voorkomend in Tsjechië en Rusland , sommigen beweren dat deze enkel een mutatie is van de Tyto alba .

Masker : breed en donker roestkleurig.
hartvormige harde sluier met donkerder streepjes .

Kop : donker grijs tot roetzwart, fijn zilverachtig gepareld en donkerder afgelijnd .

Oog : grote ogen met zwarte iris .

Snavel: donker tot bleek grijs hoornkleurig en bijna tot op de punt bevederd .

Traanstreep :donker contrasterend in het masker .

Rugdek : grijsbruin tot roetzwart met kleine zilverachtige pareling.

vleugels : roetkleurig met grotere verspreide bleke vlekjes

Borst en flanken :blekere grondkleur met fijne donkergrijze tot roetzwarte vlekken .

Staart : zwart en opvallend kort

Tenen :donker grijs tot groenachtig geel met zwarte klauwen.

Poten : bevederd

*Komt ook voor in de regenwouden van New Guinea en Australië

Latijnse benaming : **Athene cunicularia**

Nederlandse benaming : **Konijnenuil**



Pluspunten : mooie zware en goed afgelijnde V-vormige koptekening . Grote heldere ogen .

Opmerkingen : onderbroken V-tekening en keelband

Algemene lichaamskleur : bruine tot bruingrauw-grijze bovenzijde met bleke vlekken en lichtbruine onderzijde met vaalwitte vlekjes in druppelvorm en horizontale bestreping .

Grootte : 18- 25 cm

Snavel: lichtgrijze basis en licht hoornkleurig naar de top toe .

Kop : groot in verhouding met het lichaam ,licht bruin tot donker grijs met vaalwitte vlekjes en streepjes

Oogkleur : geel met zwarte pupil en omringd door een krans van fijne streepjes .

Neus :vaalwitte bevedering die V - vormig verder loopt naar de **zware vaalwitte wenkbrauwen** ; deze lopen door, over en voorbij de ogen.

Keel : half maanvormige vaalwitte vlek die donker afgelijnd is .

Rugdek : licht bruin tot bruingrauw-grijs grote verdeelde vaalwitte druppelvormige vlekjes .

Vleugels : donkerder met horizontaal lopende vlekken .

Borst :beige--bruine ondergrond met vaalwitte vlekjes op de bovenborst en bruine horizontale gebogen bestreping op de buik .


Flanken : beige-lichtbruine grondkleur met donkerder bruine horizontale gebogen bestreping ..

Poten : lang ,licht bevederd met donkere tot zwarte nagels.

Staart : kort en rond ,bruin tot bruingrauw met drie tot vijf smalle vaalwitte dwarsbanden.

Geslachtskenmerken ; Wijf normaal iets forsiger en de tarsel een witter gezicht

Kleurverschil bij de *Athene cunicularia* (konijnuiltje)



Juveniel



Latijnse benaming : **Buteo regalis**

Nederlandse benaming : **Koningsbuizerd**



Meest voorkomende fouten ; te vlekkerig en assymetrisch

:geschonden hoorndelen

Gaven en pluspunten; Levendige ogen en zoveel mogelijk symmetrische tekening

Algemene lichaamskleur : grote variatie van vuilwit-bruin gevlekt en gestreept tot rossig - donkerbruin met vuilwitte omzoming.

Koptekening : bleek vaalwitte tot beige-achtig met grijsbruine streepjes rond de ogen , bovensnavel en in de wangen .

Schedel : is meer gevlekt

Nek : gevlekt

Oog en iris : licht parel grijs met zwarte pupil

Neus en mondhoeken kleur : lichtgeel eigeel.

Snavel : is grijs aan de basis en zwart naar de punt toe .

keel : wit – beige en onder de snavel zeer fijn lichtbruin gestreept.

Borst : beige ,licht bruinachtig met bruine streepjes en gevlekt aan de zijkanen.

Buik : vaalwit tot beige –bruin met donkere vlekken .

Aars : lichtbruin tot vaalwit .

vleugels en rugdek : rossig tot grijs met donkerder veertjes die iets lichter omzoomd zijn .


Lange vleugelpennen : grijsachtig met lichtere omzoming en donkerder grijs geband .

Staart : grijsachtig met donkerde banden en lichtere eind zoom .

poten en teennagels : eigeel met zeer zwarte teennagels
Loopbenen; zwaar bevederd rossig en met donkerder horizontale bestreping

Latijnse benaming : **Strix Nebulosa**

Nederlandse benaming : **Laplanduil**



Meest voorkomende fouten ; onduidelijke en niet breed uitlopende kin vlek

Gaven en pluspunten; mooie maskerlijnen en symmetrische tekening

Algemene lichaamskleur :boven en onderzijde zijn grijswitachtig met vuilwitte dwarsbanden en spikkels

Borst en buik : grijs ,fijn gestreept en wat lichter van kleur

Kop : vanaf de sluier tot in de nek, donkere regelmatige ring tekening

Grote gezichtsluier met concentrische donkere ringen die gescheiden zijn door een donkere middenstreep
Vuilwitte sikkelvormige van boven het oog naar binnen beneden lopende tekening weerszijden de snavel

Oogkleur : geel met zwarte pupil

Snavel kleur : volledig lichtgeel met twee donkere neusgaten
De snavel is omrand met zwarte bevedering

Kin vlek : zwart , fijn aan de keel en verbredend tot onderaan het masker

Langs weerszijden van de kin vlek is een vuilwitte maskervlek

Rugdek : donker grijsachtig vuilwit met donkere lengtevlekken en banden

vleugels : donker grijsachtig wat bewolkt vleugelschild met lichtgrijze middenvleugel eind omzoming

Grijsachtige grote vleugelpennen met donkere en vuilwitte horizontale banden

Poten : donker en bijna volledig bevederd met donkerbruine teennagels

Staart : donkergrijs en wat gevlekt met donkere brede eind band
grootte : ongeveer van de Europese oehoe (maar meer bevedering

verschil in geslacht : het wijfje is normaal groter

Lizardbuizerd : *Kaupifalco monogrammicus*



Pluspunten : Goede aflijning en intensieve borst, flank en dij tekening

Fouten : onduidelijke en niet symmetrische tekening

Té losse aarsbevedering / te vlekkelig rond de keelstreep

Algemene lichaamskleur : voorhoofd, nek , rug en vleugels zijn donker muisgrijs .

Snavel : oranjerood , van in het midden tot de punt is de snavel zwart

Ogen : zwart met bruinoranje oogring en bleke wenkbrauw
Licht vuilwitte oogrand .

Keel: in het midden een naar de borst lopende zwarte streep met langs weerszijden een vuilwitte vlek van onder de kin tot aan het einde van de zwarte streep.

Borst : effen muisgrijs

Buik , flanken en dijen : van aan de borst tot aan de aars heeft de vuilwitte ondergrond een fijne mooi afgetekende horizontale donkere bestreping .

Poten: diep oranje met zwarte teennagels

Vleugels : het schild is effen donker muisgrijs

Vleugelpennen : donker muisgrijs met vuilwit-grijze eindomzoming.

Okselveren: vuilwit.

Staart : zeer donker grijs tot zwart met vuilwitte brede midden en eindbanden .

Aars : vuilwit van kleur

Latijnse benaming : **Bubo lacteus**

Nederlandse benaming : **Melk oehoe**




Opmerkingen :

Onderbroken wang band

Beschadigde hoorndelen

Te bewolkte grijsbruine rugkleur



Algemeen :grootste uil van Afrika , de kleur is overwegend licht tot donkergrijs.

Snavel : leigrijs met donkergrijze zware behaarde neusdop.

Voorhoofd en schedel :lichtgrijs boven de neus en donkerder schedel met fijne dwarsstreepjes .

Gezicht : ovaal , lichtgrijs fijn gestreept en langs weerszijden een zware wang band (**C**).

Ogen :donkere pupil met roze oogleden bij de adult

Oren : goed ontwikkelde pluizige oorpluimen

Keel : donkerder grijs met fijne verticale gebogen tekening

Borst en buik : bleker dan de keel met dezelfde tekening

Rug :licht dot donkergrijs met bruine waas

Vleugels : donker grijs met bleke naar beneden lopende veertjes op de schouders (**A**), aan de onderzijde bevinden zich zware donkere banden op de vuil-grijswitte ondergrondkleur .

Vleugelpennen : donker bruin tot donker grijs .

In het midden is er een grijsbruine blekere dwarsband (**B**).

Loopbenen :de dijen zijn zwaar bevederd en lichtbruin horizontaal gestreept .

Teennagels : zwart

Staart ; afwisselend grijsbruin en donker geband .

Positieve punten :


Mooi gekleurde roze oogleden

Mooie symmetrische schoudervlekken

Symmetrische buik tekening

Latijnse benaming : **Ninox Novaeseelandiae**

Nederlandse benaming : **Nieuw zeelandse Boekboekuil**



Pluspunt : Goed verdeelde en symmetrische vlekken ,
Goed contrasterende wangvlekken, grote ronde ogen.

Opmerkingen : te liggende of bange houding

Algemeen : behoren tot kleine Valk uilen, ze gebruiken meer de ogen dan de oren . *Er verschillende ondersoorten .
Dankt zijn naam zijn het typische Boek boek geroep.

Kop : donker bruin tot bijna zwart met grote oog en wangvlekken.

Masker : vanaf de keelstreep loopt langs de binnenkant van de ogen een dikke witvaalkleurig- bruine V - vormige bevedering tot boven het middelste van de ogen , verder kan dan deze bevedering verder lopen rondom de ogen (pluspunt !) (A)

Oogkleur : Boekboekuilen uit de droge gebieden van Australië zijn lichter van kleur en hebben geelgroene ogen , deze afkomstig uit Tasmanië zijn ze donkerder met donker gele ogen.

Snavel: hoornkleurig met donkerder top .

Neus : grijs hoornkleurig .

Rugdek : bruin bevederd met lichtbruine omzoming en grotere bleke vlekken .

Juist tegenaan loopt een bleke vlekkenband vanaf de schouders naar beneden .

Vleugels : lang , donkerbruine schouders en buitenste van de slagpennen , dan verder bruin en lichtbruin omzoomd .

Borst en flanken : grote roestbruine vlekken in druppelvorm op de vaalbruine grondkleur .

Poten : bevederde loopbenen tot op de tenen , zwarte teennagels

Verschil in geslacht : wijf iets groter dan de tarsel

Latijnse benaming : **Asio otus**

Nederlandse benaming : **Ransuil**



Opmerkingen :

Onderbroken masker omlijning

Beschadigde hoorndelen



Algemeen :

Middelgrote uil met opvallende oorpluimen.

Snavel : grijs aan de basis en in het midden en zwarte top die langs weerszijden zwaar bevederd is.

Voorhoofd en schedel : grijsachtig op het voorhoofd met blekere spikkels en bruinachtig naar de schedel met donkere vlekjes .

Ogen : geeloranje en omgeven van een verenkrans

Oren: staan meestal rechtop in werkhouding(in rust liggen ze plat) . ze bezitten een zware donkere lengtestreep en zijn lichtbruin omzoomd . Tussen de ogen is de vaal wit-bruine gezichtsluier onderbroken door de scherphoekige voorhoofd bevedering en de vaalwitte wenkbrauwen.

Borst en buik : licht roestgeel – bruinachtig met zware donkere lengtestrepen en fijnere donkere dwarsstreepjes

Rug : geelbruin met donkere op boomschors lijkende grijsbruine vlekken en spikkels .

Vleugels: lichter bruin met donkerder dwarsbanden

Loopbenen en tenen : bevederd

Teennagels: zwart

Staart ; zware horizontale donkere banden bovenaan en lichtbruin met horizontale bandjes onderaan .

Aars ; vaalwit lichtbeige-bruin met fijne verticale streepjes .

Positieve punten :

Mooie symmetrische schoudervlekken

Symmetrische buik tekening

Latijnse benaming : **Falco cherrug**

Nederlandse benaming : **Sakervalk**



Meest voorkomende fouten ; te vlekkerig en asymmetrisch

:geschonden hoorndelen

Gaven en pluspunten; Levendige ogen en zoveel mogelijk symmetrische tekening,

Algemene indruk : grote zwaargebouwde valk

Kop: lichter vuilwit tot beige-bruin met fijne donkerder streepjes

Oog : gele oogring en donkere pupil .

Onder de ogen zijn donkere veertjes, deze verminderen de weerkaatsing van het licht in de ogen

Snavel kleur : grijs aan de basis en donker tot zwart naar de top toe.

Neus : in de neus zitten schotjes (om de verandering van luchtdruk op te vangen bij snelle manoeuvres)

Vleugels : warmbruine tot donkere veertjes die lichter omzoomd zijn , de ondervleugel is bleek met donkere punten aan de handpennen.

Vleugelpennen : lang en donker .

Rug : bruinachtige bevedering met lichte bruine omzoming

keel : licht gestreept met een fijne baardstreep

Borst : zwaar gestreept

Flanken : donkere druppelvlekken op de vaalwitte ondergrond .

Poten : geel met zware klauwen , 2/3^{de} bevederd en zwarte teennagels

Staart : Lang : langer dan de slechtvalk , bruin met ovale vaalwitte vlekken

verschil in geslacht : geen (vrouwtje over het algemeen iets zwaarder)

Latijnse benaming : **Bubo bubo Sibericus**
Nederlandse benaming : **Siberische Oehoe**



Positieve punten; zachte lichte grond kleur

Mooie symmetrische vlek en streeptekening

Opmerkingen ; geschonden hoorndelen,
agressieve houding , onregelmatige tekening

Algemene kenmerken : een der grootste oehoes met dezelfde kenmerken als de Europese oehoe maar in blekere tinten.

Voorhoofd ; vanaf de neus donker fijn gestreept overvloeiend naar vlekjes op de schedel

Oorpluimen : groot en lang , bruinachtig maar bleker dan de Europese oehoe met bruinachtige boven pluimpjes

Nek : bruin beige met fijne donkere lengtestreepjes .

Rug : Licht bruinachtig vaalwit met fijne naar onder verbredende donkere symmetrische lengtestreepjes .

Vleugels : iets bruiner met een duidelijk symmetrische donkerder band tekening .

Ogen : variëren van felgeel tot vuuroranje iris met lichtere pupil dan de Europese oehoe , van boven het oog tot en met de oorpluimen loopt een dikke donkere streep.

Snavel : zwart en zwaar bevederd .

Borst ; licht vaalwit grijsachtig met onder de keel donkere verticale lengte vlekken in druppelvorm die fijner worden naar onder toe , in het midden is een bleke vlek .(niet foutief!)

Buik en aarsstreek : is bleek okerkleurig –bruinachtig met fijne donkere verticale lengtestreepjes en lichtbruine gebogen horizontale tekening tot onder de staart .

Rug ; beige – crème tot licht bruin grondkleur met donkerder vlekken die lichter omzoomd zijn

Poten; zwaar bevederd

Teennagels ; donker grijs tot zwart met zwaar bevederd e tenen

Verschil met de Europese oehoe : lichter verenkleed

Latijnse benaming : **Falco peregrinus**

Nederlandse benaming : **Slechtvalk**



Meest voorkomende fouten ; te vlekkerig en asymmetrisch.

,geschonden hoorndelen .

Gaven en pluspunten; Levendige ogen , zoveel mogelijk symmetrische tekening, intensief en goed contrast.

Algemene lichaamskleur : blauwachtige tot leigrijze bovenzijde en vale tot bruin-beige getekende onderzijde .

Kop : grijs - donker gestreept , maar meestal donker tot zwart

Wangen : donker met zwarte snorbaard.

Oog en iris : donker oog met gele oogomranding .

Neus: van licht tot diep gele neus .

Snavel :geelgroenachtige basis en grijs tot blauwzwarte top.

Keel : vaalwit- lichtbruine keel en keelband lopend tot voorbij de wangen .

borst: de bovenborst is bleek met fijne verticale streepjes .

Buik en flanken : crèmekleurig tot lichtbruin met donkere maanvormige gebogen vlekjes .

Dijen : zwaar bevederd vaalwit tot lichtbruinachtig en donker geband .

Rugdek : leigrijs tot blauwachtig zwart

Vleugels : donker met lichtere omzoming .

Stuit :vaalbruin-beige met fijne bestreping.

Staart : donker met lichte omzoming

poten en teennagels : eigeel met zwarte teennagels

Juveniele vogels bezitten meer bruinachtige kleuren.

Wijf wat groter dan de tarsel en iets zwaardere ondertekening

Er bestaan ook slechtvalken in de bleke vorm.

Latijnse benaming : **Bubo scandiacus** (Nyctea scandiaca)
Nederlandse benaming : **Sneeuwuil**



Positieve punten ; goed contrast en mooie symmetrische vlek en streeptekening

Algemeen volwassen kleed : **Tarsel** : sneeuwwit

Wif : gestreept en gevlekt van bruin tot zwart

Ogen : geel met zwarte pupil

Gezicht : wit met een zware snorbevedering en witte kopzijde

Keel: de keel is wit breed van af het gezicht en versmallend naar onder toe (**verder lopend wit in de midden borst is niet foutief**)

Snavel : kort en zwart

Borstzijde en flanken : mooie maanvormige gebogen dikke verticale bestreping (hoe verder die tekening doorloopt hoe beter)

Onderbuik en onder de staart : verticale fijne fijnere horizontale bestreping

Vleugels : dikke driehoekvormige gebogen vlekken

Onder-vleugels :overwegend wit met naar de schouders toe en naar het buitenste van de vleugelpennen lichtere vlekjes

Voorhoofd en schedel : vertrekkend van boven de neus is de kleur wit , op de schedel bevinden zich symmetrisch donkere vlekjes

Rug ; symmetrische horizontaal lopende gebogen bestreping

Staart : dikke van elkaar liggende horizontale vlekken

Dijen : zwaar bevederd en gestreept tot licht gevlekt

Poten ; zwaar bevederd en minder gevlekt tot wit

Teennagels ; de tenen zijn zwaar bevederd en de nagels zijn donkergrijs tot zwart

Opmerkingen ; Jongere vogels kleuren van donker grijs tot wit gevlekt naar wit

Latijnse benaming : **Bubo scandiacus** (Nyctea scandiaca)
Nederlandse benaming : **Sneeuwuil**



Positieve punten ; goed contrast en mooie
symmetrische vlek en streeptekening

Opmerkingen ; Jongere vogels kleuren van
donker grijs tot wit gevlekt naar wit

Algemeen volwassen kleed : **Tarse**l : sneeuwwit

Wijf : gestreept en gevlekt van bruin tot zwart .

Ogen : geel met zwarte pupil

Gezicht : wit met een zware snorbevedering en witte kopzijde

Keel: de keel is wit breed van af het gezicht en versmallend naar
onder toe (**verder lopend wit in de midden borst is niet foutief**)

Snavel : kort en zwart .

Borstzijde en flanken : mooie maanvormige gebogen dikke
verticale bestreping (hoe verder die tekening doorloopt hoe
beter)

Onderbuik en onder de staart : verticale fijne fijnere horizontale
bestreping

Vleugels : dikke driehoekvormige gebogen vlekken

Onder-vleugels :overwegend wit met naar de schouders toe en
naar het buitenste van de vleugelpennen lichtere vlekjes

Voorhoofd en schedel : vertrekkend van boven de neus is de
kleur wit , op de schedel bevinden zich symmetrisch donkere
vlekjes

Rug ; symmetrische horizontaal lopende gebogen bestreping

Staart : dikke van elkaar liggende horizontale vlekken

Dijen : zwaar bevederd en gestreept tot licht gevlekt

Poten ; zwaar bevederd en minder gevlekt tot wit

Teennagels ; de tenen zijn zwaar bevederd en de nagels zijn
donker grijs tot zwart

Latijnse benaming : **Accipiter nincus**

Nederlandse benaming : **Sperwer Musket**



Meest voorkomende fouten ; te veel bontachtig in de keel

Gaven en pluspunten; intensieven rug kleur en borsttekening

Kop: effen leigrijs vanaf de neus tot in de nek

Nek, rug en schouders: leigrijs met een bewolkte omzoming .

Vleugels : breed en afgerond , bruinachtig grijs tot zelfs donkerder dan de rug en met een lichte afzoming.

Oog : geel oranje met donkere iris .

(Havik = oranje tot diep rood oog en wenkbrauwstreep !)

Neus : geel met een lichtgroene schijn

Snavel : grijs aan de basis en donker tot zwart naar de top.

Wangen : licht tot roestbruin met donkerder streepjes

Keel: bleek vaalwit tot bruinachtig met lichte streepjes

Borst ,buik, flanken : vaalwit tot bruine grondkleur met bruine dikke horizontale dikke gebogen bestreping

Aarsstreek: zeer lichtgrijs tot wit.

Staart : grijs met donkere dwarsbanden aan de onderzijde

Poten : lang en geel .

Teennagels : zwart


Verskil in geslacht : Musket (mannelijke benaming bij de sperwer !) is meer dan ¼ tot de helft kleiner dan het wijf

Latijnse benaming : **Accipiter nincus**

Nederlandse benaming : **Sperwer wijf**



Sperwer Wiif



Meest voorkomende fouten ; te veel wit in de rug

Gaven en pluspunten; mooie koekoekstekening

Kop: vanaf de neus is een lichtgrijze bestreping op de grijze grondkleur

Nek, rug en schouders: leigrijs met een bewolkte omzoming .

Vleugels : breed en afgerond , donkerder dan de rug met een lichte afzoming.

Oog : geel met donkere iris .

(bij de havik is het oog orangerood tot dieprood !)

Neus : geel met een lichtgroene schijn

Snavel : grijs aan de basis en donker tot zwart naar de top.

Wenkbrauwstreep : vaalwit , minder duidelijk dan bij de havik , beginnend voor het oog en lopend tot goed voorbij het oog .

Keel, borst ,buik, flanken : koekoekstekening ; lichtgrijs met donkere tot zwarte horizontale dikke gebogen strepen.

Aarsstreek: zeer lichtgrijs tot wit.

Staart : grijs met donkere dwarsbanden .

Onderzijde : bijna volledige koekoekstekening .

Poten : lang en geel .

Teennagels : zwart

Verschil in geslacht : wijf is meer dan ¼ tot de helft groter dan de ***Musket** (mannelijke benaming bij de sperwer !)

Latijnse benaming : **Surnia ulula**

Nederlandse benaming : **Sperwer uil**



Positief : intensieve kleuren en symmetrische tekening

Fouten : te weinig wenkbrauwstreep , fletse bestreping

Jongere vogels : nog geen of weinig sperwertekening

Algemene lichaamskleur : vuilwitte ondergrond met sperwer bestreping en bleke vlekken

Ogen : geel met zwarte pupil

Snavel : licht geelachtig

rond de snavel is een donkere onregelmatige vlek .

Gezicht : Vuilwitte wangen met een zwarte zijdelinkse band ,

Keel : is licht grijs-zwart afgezoomd .

Kop : van af de snavel tot in de nek is deze licht gespikkeld en symmetrisch gevlekt .

Borst : tot aan de aars is een fijne intensieve horizontale zoom tekening boven de vuilwitte ondergrond kleur.

Onderzijde : onder de vleugels en staart is een zelfde tekening als op de borst maar lichter van kleur en intensiviteit

Rug : donker grijs-bruinachtig en vuilwit gevlekt

Vleugels : de kleine middelste vleugeldekveren zijn donker grijs met grotere vuilwitte vlekken



Kleine slagpennen



grote slagdekpenen

Staart : opvallend lang , en zwart met vuilwitte dwarsbanden .

Poten : bruinachtig en licht behaard , bijna nooit te zien .

Teennagels : zwart

Steenarend : Aquila chrysaetos



Positieve punten : Levendige ogen ,

mooi contrast tussen de donker en goudkleur en de omzoming

Niet te agressieve houding ongeschonden hoorndelen

Opmerkingen : Jonge vogels hebben een witte staart en witte boven en onder vleugelvlekken (na 4 à 5 jaar verdwijnt het wit)

Algemene lichaamskleur : donkerbruin , iets bleker aan de onderzijde .

Snavel : lichtgrijze snavelbasis en donkerder naar de top toe

Neus en mondstreep : goudgeel

Iris, ogen iris : donker tot lichtbruin ogen , bleke oogring

Voor het oog is weinig bevedering , wel enkele langer haren

Voorhoofd en kop : lichtbruin tot bruینگoudkleurig , in nek zijn verlengde veren in dezelfde kleur

Rug en stuit : donkerbruin met blekere omzoming

Boven staart : donkerbruin met enige onregelmatige bruine en grijsachtige dwarsbanden

Onder staart : donkerbruin bij de adult vogels

Keel : donker goudkleurig en donker gestreept

Borst en buik : iets lichtere kleur dan de bovenzijde

Vleugel en schildbevedering : bruin met lichtbruine omzoming

Vleugelpennen : donkerder dan het vleugelschild en licht omzoomd


Dijen en poten : de dijen zijn tot aan de tenen bevederd, de poten en tenen zijn goudgeel

Teennagels ; zo donker mogelijk tot zwart

De Steenarend is altijd te herkennen aan de brede zwarte band op het staarteinde

Latijnse benaming : Athene noctua

Nederlandse benaming : Steenuil



Steenuil

Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige rug en borst tekening .

Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .

Algemene lichaamskleur :bruine tot bruingrauwe bovenzijde met bleke vlekken en vaalwitte onderzijde met donkere vlekjes en streepjes . (er bestaan 28 verschillende soorten !)

*Bestaat zowel in de bruine als in de grijze vorm.

Grootte : = 21 tot 23 cm (= een kop groter dan dwerguiltje)

Snavel: lichtgrijze basis en licht hoornkleurig naar de top toe .

Kop :breed en redelijk plat ,bruin met vaalwitte vlekjes en streepjes , in de nek is een vaalwitte kraag .

Sommige soorten hebben in de nek twee oogvlekken om vijanden af te schrikken (oa. De geparelde steenuil)

Oogkleur : geel met zwarte pupil.

Neus :vaalwitte bevedering die verder loopt naar de **redelijk zware vaalwitte wenkbrauwen** .

Gezicht en wangen: vaalwitte vlekjes en lijntjes .

Rugdek : bruin tot bruingrauw met regelmatig verdeelde vaalwitte –lichtbruine vlekjes .

Vleugels : donkerder en gevlekt.

Borst :Vaalwitte ondergrond met een mindere bruine lengte bestreping .

Flanken : meer warm bruin met vaalwitte tot lichtbruine vlekjes.

Poten : lang vaalgeel bevederd met donkere tot zwarte nagels.


Staart : kort en rond ,bruin tot bruingrauw met drie tot vijf smalle vaalwitte dwarsbanden.

Gedrag : bij opwinding typische op en neer en zijdelingse staartbewegingen .

Foto : Trebola with admission ; Verbeke Wilfried

Latijnse benaming : **Falco tinnunculus**

Nederlandse benaming : **Torenvalk**



Gaven en pluspunten;

Symmetrische tekening ,

intensieve kleur

Meest voorkomende fouten ; te onregelmatig gevlekt

Algemene lichaamskleur- Tarsel : roodbruin- steenrode en grijsblauwe bovenzijde , beige-bruine onderkant.

Kop kleur en tekening : grijsblauw tot in de nek en donkerfijn gestreept.

Oogkleur : oranjegele oogring met zwarte pupil

Snavel kleur : grijze basis met lichtgele schijn en zwart naar de punt toe met gele neus .

Wangen : vuilwit tot blauwgrijs en een donkere baardstreep.

Keel : beige-bruin zonder tekening

Rugdek : steenrood tot bruinrood met zwarte druppelvormige vlekken die horizontale banden vormen.

Slagpennen : grijsachtig tot donkergrijs -zwart met vuilwitte eind zoom.

Borst en flanken : de boven borst is beigebruin met fijne donkere streepjes, borst en flanken zijn bruiner met donkergrijze druppelvlekken

Aars : licht tot warm bruin en niet gevlekt .


Stuit : blauw-grijs effen bij de tarsel ,bij het wijfje is die bruin en volledig getekend met vlekken die horizontale banden vormen.

Staart : lang en grijszwart en dwarsbanden met zwarte eind band die vuilwit afgezoomd is .

Poten : diep geel-oranje met zwarte teennagels

Latijnse benaming : **Falco tinnunculus**

Nederlandse benaming : **Torenvalk**



Gaven en pluspunten;

Symmetrische tekening ,

intensieve kleur

Meest voorkomende fouten ; te onregelmatig gevlekt

Algemene lichaamskleur- Wif : beige bruine ondergrond ,lichtbruin bovendek kleur en donkerder bruine vlekjes en streepjes

Kop kleur en tekening : lichtbruin en fijn gestreept

Oogkleur : gele oogring met zwarte pupil

Snavel kleur : licht grijze basis met lichtgele schijn en zwart naar de punt toe met gele neus .

Wangen : vuilwit tot bruingrijs en een lichtbruine baardstreep.

Keel : beige-bruin zonder tekening

Rugdek en mantel : lichtbruin met driehoekige gebogen symmetrische vlekjes

Slagpennen : grijsachtig tot donkergrijs met vuilwitte eind zoom.

Borst en flanken : de boven borst is beigebruin en fijn lichtbruin gestreept, borst en flanken zijn meer beigebruin met donkerbruine druppelvlekken

Aars : beige bruin en niet gevlekt .

Stuit en staart : bruin en volledig getekend met vlekken die horizontale banden vormen en met een zwarte eind band die vuilwit afgezoomd is ..

Poten : diep geel-oranje met zwarte teennagels

Latijnse benaming : Asio flammeus.

Nederlandse benaming : Velduil



Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige rug en borst tekening , open sluier , kromme neuslijn

Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .

Grootte : ongeveer 38 cm (wijfje is iets groter en donkerder)

Kop : bleek beige goudgeelachtige hartvormige gezichtsluier met donkerbruine vlekken .

Oor : de oorpluimpjes zijn erg klein en meestal niet zichtbaar.

Oog : geel met zwarte pupil en zwarte oogvlekken , omrand door een krans van veertjes .

Gezicht en wangen: vaalwit- beigebruin , smal boven de neus en verbredend tot het bovenste van de sluier .

Goed ontwikkelde snorharen.

Snavel : zwart .

Rugdek : zwartbruin en roomkleurig gevlekt en gestreept.

Vleugels : lang , de bovenzijde is zwartbruin met beige vlekken en een beige achterrand , een opvallende zwartbruine polsvlek en vleugelpunt .

De achtervleugelrand is wit maar bij bleke exemplaren niet te zien
De onderkant is beige .

Borst : zwaar contrast ; licht geel bruin- beige , zwaar gevlekt en gestreept onder de keel en lichtere fijne lengtestreepjes op de borst.

Poten en tenen : zwaar bevederd met zwarte teennagels .

Staart : roestgeel met donkere banden

Latijnse benaming : **Parabuteo unicinctus**

Nederlandse benaming : **Woestijnbuizerd**



Meest voorkomende fouten ;

Té schuw of agressief , geschonden hoorndelen

Té veel vuilwitte strepen in de keel of boven de neus

Gaven en pluspunten; diepe intensieve kleuren en goede omzoming

Algemene lichaamskleur : donker bruin zwart met warmbruine velden

Kop: donker grijsbruin tot bijna zwart en fijn gestreept

Oog ring en iris : zwarte pupil ,lichtbruine iris en geelachtige oogring

Snavel : grijze basis en donker naar de top toe ,

Neus : eigeel

Keel : ,bovenborst,buik : zwarte en vuilwitte lengtestrepen of vlekken tot gezoomde bijna zwarte bevedering .

rugdek : donkerbruin met lichtbruin omzoomde veertjes

Schouders: warmbruin, met kleine donkere vlekjes die licht omzoomd zijn .

vleugels :van het vleugelschild naar de vleugelpennen zijn de grotere vlekken ook lichtbruin omzoomd

Midden en grote vleugelpennen :donker tot bijna zwart en bruin omzoomd .

Staart : donker tot bijna zwart met vuilwitte basis en eindband
Aan de onderkant is een koekoekstekening te zien

Dijen : lange bruine –vuilwitte tot warmbruine donkere veren ,
deze kunnen ook afgezoomd zijn in lichtbruin

Poten : lichtgeel met donkergrijze teennagels

verschil :volwassen jonge vogel en overjarige

Witwangdwergooruil / Otus Leucotis



Pluspunten: zo bleek mogelijke wangen en gezicht

Fier recht opstaande oorpluimen

Symmetrische tekening en fiere presentatie

Opmerkingen: te vlekkelig, asymmetrische tekening, te veel hangende vleugels en mindere presentatie

Voorhoofd en nek: donkergrijs gestreept en lichter gevlekt

Oor: donker overvloeiend met licht grijze veertjes en vlekjes, lange oor pluimen met zwarte punt

Ogen: oranje-rood met donkere pupil, onder de ogen en langs de snavel bevinden zich lange haren

Gezicht: tussen de ogen brede wenkbrauw in vuilwitte bevedering, in de wangen in een vuil witte tot witte kleur met ietwat weinig lichte lengtestreepjes (bij jonge vogels is het gezicht grijzer)

Wangen: bleek en afgezoomd door een zwarte brede band

Neus: bruin met een licht bruine snavel met bruingele punt

Keel: bleek in de kin en verder grijs-wit omzoomd met donkere verticale lengtestreepjes

Borst: vuilwit kleurige borst vanaf de keel, in het midden tot tussen de tenen; langs weerszijden donkerder grijs met donkere verticale lengtestreepjes

Buik en onderbuik: vuilwitte brede strook die breder wordt naar onder toe (bij jonge vogels is de vuilwitte kleur meer grijsachtig)

Vleugels: donkergrijs met donkere verticale streepjes.

Vleugelbocht: vuilwit, dan grijs met donkere bestreping en verder bleke veertjes met grijze omzoming

Rug: donker grijs met donkere verticale bestreping en vlekjes

Loopbeen: vuilwit beige kleur en lang bevederd

Teennagels: zwart

Amerikaanse Torenvalk ; Falco Sparverius Tarsel

Schedel en voorhoofd; donker grijs , licht grijs boven de neus en donkerder naar het midden van de schedel, dan overvloeiend naar bruin

Neus ; geel grijs

Snavel ; de basis is lichtgrijs naar donkere snavelpunt

Het oog is zwart , licht gele oogring , deze is licht omzoomd met een vuil witte vlek naar onder toe ; daarachter een donkers brede streep , daarachter terug een bleek bruine kleur en een donkere vlek

Keel ; bleek vuilwit met daarachter zwarte baardstrepen

Borst ; onder de keel een licht bruin kleur en overvloeiend naar vuilgrijsbruin

Flanken ; grijs met donkere vlekjes

Vleugels ; donkergrijs met zwarte vlekjes

Vleugelbanden ; donker grijs met op de buitenste veren bleke stippen en lichtgrijze vleugelomzoming

Rug ; warm bruin met zwarte tekening

Staart ; warmbruin met zwarte achterste vlekken en vuilwitte **staarteinden** , de onderste staartpennen zijn grijs met zwarte vlekken

Positieve punten ; mooie intensieve kleuren

Symmetrische tekening en goede presentatie

Meest voorkomende fouten; geschonden hoorndelen en bevedering ,onregelmatige en slecht verdeelde tekening



Tarsel



Wijf